

Aromia bungii

izgled



<https://www.fruitjournal.com>

Aromia bungii (Coleoptera, Cerambycidae) je karantinski štetni organizam koji napada biljke roda *Prunus*, kao najznačajnije domaćine, iako se može naći i na drugim rodovima i vrstama. U Evropi najveće štete prouzrokuje na breskvi i kajsiji, potom šljivi, trešnji, bademu.

Vrsta potiče iz istočne Azije, prisutna je u Kini, Koreji, Tajvanu, Vijetnamu, Japanu, Rusiji. Prvi nalaz u Evropi bio je 2008. godine, kada je u Velikoj Britaniji nađena u drvenim paletama. Na otvorenom je nađena u Njemačkoj 2011. godine, a 2012. u Italiji, gdje je prisutna u Kampaniji i Lombardiji. Nalazi se na listi prioriternih karantinskih štetnih organizama zbog rizika da u slučaju unošenja prouzrokuje veoma značajne štete na ekonomski značajnim biljnim vrstama.

Aromia bungii nije prisutna u Crnoj Gori i najveći rizik u smislu načina njenog unošenja predstavlja međunarodna trgovina tako što se jaja, larve, lutke mogu nalaziti u sadnom materijalu *Prunus*-a, kao i u drvenoj ambalaži i proizvodima od drveta, zbog čega su propisani posebni fitosanitarni zahtjevi za uvoz.



Aromia bungii (AROMBU) - <https://gd.eppo.int>



<https://gd.eppo.int>

Odrasle jedinke *Aromia bungii* su dužine 20 do 40 mm, sjajno plavo-crne sa pipcima koji su duži od tijela. Lako se uočavaju zbog jarko crvenog vratnog štita sa par snažnih lateralnih tuberkula.

Tek ispiljena larva je dužine oko 2,5 mm, prolazi kroz četiri razvojna stadijuma, u četvrtom je duga 42-52 mm i tipična je cerambicidna larva, blijedo-žićkasto bijela, najšira u grudnom dijelu.



Aromia bungii (AROMBU) - <https://gd.eppo.int>

životni ciklus


Životni ciklus *Aromia bungii* je sličan ciklusu drugih strižibuba. Ženke polažu jaja u pukotinama kore na deblu, obično do 30 cm iznad zemlje i glavnim granama. Larve ishranom buše galerije ispod kore, gdje se odvija i pupacija. Odrasli izlaze obično od maja do avgusta. Izlazni otvori imaju ovalni oblik prečnika oko 12 mm. Životni ciklus od jajeta do pojave odrasle jedinice može trajati od dvije do četiri godine.



kako je prepoznati?



Prvi simptomi napada *Aromia bungii* su uočljivi po velikoj količini piljevine i izmeta u osnovi napadnutih biljaka ili na račvištima grana. Mogu se uočiti i odrasle jedinice, zbog izgleda, veličine i dnevne aktivnosti, kao i izlazni otvori u kori debla i grana.



**Ukoliko uočite
navedene znakove
kontaktirajte nas**

+382 20 201 945

upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me



**Uprava za bezbjednost hrane,
veterinu i fitosanitarne
poslove**