

Terapijske preporuke

Oblik bolesti	Ustanova	Terapijska preporuka
<p>Lakša klinička slika</p> <p>Pozitivan nazofaringealni bris (PCR na SARS-CoV-2, Ag test)</p> <p>2. Asimptomatska</p> <p>3. Vrlo blaga klinička slika</p> <p>4. Bolesnici bez komorbiditeta i sa blagim oblikom infekcije (hospitalizovani pacijenti zbog druge medicinske indikacije) sa pO₂ > 94% i bez Rtg znakova pneumonije</p>	<p>Kućno liječenje i izolacija uz kontrole i nadzor Covid ambulanti</p>	<p>Vitaminska th: alfacalcidol tbl. (Alpha D3) 1x2 mcg, vitamin C 1x1g (ukoliko nema bubrežnih smetnji)</p> <p><i>* Ne davati antibiotike rutinski! Zbog rizika ozbiljnih neželjenih dejstava i rastuće rezistencije na antimikrobne lijekove.</i></p> <p>Antivirusna th. (započeti najkasnije do 5. dana od početka tegoba): Favipiravir tbl. 1600 mg na 12 h, prvi dan, zatim 600 mg na 12h još 4 dana (lijek se primjenjuje kod oboljelih koji imaju simptome)</p> <p>Simptomatska th. Monoklonska Att ((započeti najkasnije do 7. dana od početka tegoba): Kasirivimab+imdevimab iv >12 godina i >40 kg 600mg + 600mg iv u inf.</p>

Oblik bolesti	Ustanova	Terapijska preporuka
<p>Srednje teški slučajevi</p> <p>1. Pozitivan nazofaringealni bris (PCR na SARS-CoV-2, Ag test)</p> <p>2. Srednje teška klinička slika</p> <p>3. Bolesnici sa ili bez komorbiditeta i sa srednje teškim oblikom infekcije (hospitalizovani pacijenti sa SpO₂ > 94% i sa Rtg znacima pneumonije sa ili bez znakova hipoksije pri prijemu)</p>	<p>COVID centri za bolničko liječenje</p>	<p>Antikoagulantna th: Niskomolekulrni heparin (prilog 1)</p> <p>Antivirusna th. (započeti najkasnije do 5. dana od početka tegoba): Favipiravir tbl. 1600 mg na 12 h, prvi dan, zatim 600 mg na 12h još 4 dana</p> <p>Kortikosteroidna th: (prilog 2) (dexason 6mg iv do 10 dana i ili metilprednizolon 0.5-1mg /kg u slučaju izostanka terapijskog odgovora na prethodnu terapiju)</p> <p>Monoklonska Att (započeti najkasnije do 7. dana od početka tegoba): kasirivimab+imdevimab iv >12 godina i >40 kg 600mg + 600mg iv u inf. u jednoj dozi</p> <p>Vitaminska th: alfakalcidol tbl. (Alpha D₃) 1x2 mcg, vitamin C 1x1g</p> <p><i>Primjena antibiotika samo kod vjerovatne ili dokazane bakterijske inf.!</i></p>

Oblik bolesti	Ustanova	Terapijska preporuka
<p>Teški slučajevi</p> <p>1. Pozitivan nazofaringealni bris (PCR na SARS-CoV-2, Ag test)</p> <p>2. Teška klinička slika</p> <p>3. Teška hipoksija sa potrebom za oksigenu Th (sO₂ <90%), febrilnost, multiple opacifikacije na Rtg-u pluća (ili specifične promjene na plućima videne na CT-u)</p> <p>4. Citokinska oluja (pogoršanje opšteg stanja uz ↑CRP, ↑fibrinogen, ↑D-dimer, ↑IL-6 (bar jednog parametra))</p>	<p>COVID centri za bolničko liječenje i poluintenzivne njege</p>	<p>Antikoagulantna th: Niskomolekulrni heparin (prilog 1)</p> <p>Vitaminska th: alfa-kalcidol tbl. (Alpha D3) 1x2 mcg, vitamin C 1x1g</p> <p>Oksigenoterapija: nazalni kateter ili maska (O₂ 10-15 L/min) (prilog 3)</p> <p>Antivirusna th. (ako je prošlo manje od 5. dana od početka tegoba) Favipiravir</p> <p>Kortikosteroidna th. (dexason 6mg iv do 10 dana i ili metilprednizolon 1 mg-2 mg /kg u slučaju izostanka terapijskog odgovora na prethodnu terapiju) (prilog 2) i/ili biološka terapija – tocilizumab (8mg/kg max 800 mg po dozi ponoviti u roku od 48 h ukoliko nema poboljšanja)</p> <p>Antibiotska th: prema racionalnoj primjeni antibiotika,</p>

Oblik bolesti	Ustanova	Terapijska preporuka
<p>Kritični slučajevi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozitivan nazofaringealni bris 2. Veoma teška klinička slika 3. Početak ili razvoj ARDS-a 4. Citokinska oluja (pogoršanje opšteg stanja uz ↑CRP, ↑fibrinogen, ↑D-dimer, ↑IL-6) 	<p>COVID centri za bolničko liječenje sa intenzivnom njegom</p>	<p>Primjeniti sve dostupne mjere/kombinacije intenzivnog liječenja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Što duže održavanje na ↑ protoku O₂, MV u slučaju pogoršanja 2. Kortikosteroidna th: Metilprednizolon 1-2 mg/kg, 3 dana, a zatim 1mg/kg narednih 11 dana uz postupno redukovanje doze (dozu prilagoditi tjelesnoj masi da bi se smanjio rizik krvarenja i drugih neželjenih efekata) prilog 2. 3. Biološka terapija: tocilizumab (8mg/kg max 800 mg po dozi) ponoviti u roku od 48 h ukoliko nema poboljšanja) 4. Imunoglobulni: 10-20 g/dan Ig tokom 3-5 dana <p>Antibiotska th: prema racionalnoj primjeni antibiotika,</p>

Prilog 1. antokoagulanta terapija

Prilog 2. kortikosteroidna terapija

Prilog 3. oksigena terapija

Prilog 4. proning

Prilog 5. relevantni skorovi u procjeni delirijuma, bola, anksioznosti