

|            |             |
|------------|-------------|
| Broj:      | 04-2915     |
| Podgorica: | 30.07.2026. |

UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE  
VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

Predmet: Izvještaj o pregledu klopki i plodova za muvu masline

Obavještavamo vas da je pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja (područje velikih maslinjaka – Valdanos) urađen 29.07.2026. godine. Istovremeno, sa svakog lokaliteta, uzorkovani su plodovi radi pregleda u laboratoriji. Pregled plodova je urađen 30.07.

U klopama je utvrđeno sljedeće stanje:

- Bar 1 McPhail 1 ♀♀ i 0 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 06' 16" N 19° 06' 02" E ,
- Bar 2 McPhail 0 ♀♀ i 2 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 05' 27" N 19° 07' 27" E,
- Bar 3 McPhail 2 ♀♀ i 5 ♂♂, žuta ploča 1 ♀♀ i 2 ♂♂, GPS koordinate 42° 03' 00" N, 19° 08' 27,9" E,
- Valdanos 1 McPhail 0 ♀♀ i 1 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 31" N 19°11' 02" E,
- Valdanos 2 McPhail 2 ♀♀ i 10 ♂♂, žuta ploča 3 ♀♀ i 1 ♂♂, GPS koordinate 41°56' 28" N 19° 11' 02" E,
- Valdanos 3 McPhail 1 ♀♀ i 2 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 28" N 19° 10' 57" E,
- Valdanos 4 McPhail 2 ♀♀ i 0 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 24" N 19° 11' 06" E.

Muve su hvatane u McPhail klopama na svim lokalitetima, iako uglavnom u niskoj brojnosti, a u poređenju sa prethodnim pregledom došlo je do blagog porasta, posebno na lokalitetu Valdanos 2. Na žutim pločama muve su hvatane samo na lokalitetima Bar 3 i Valdanos 2. U ukupnoj brojnosti više je mužjaka.

Pregled plodova, koji je urađen u laboratoriji, pokazao je da aktivna infestacija nije zabilježena samo na lokalitetima Bar 1 i Valdanos 3. Na lokalitetima Bar 2, Valdanos 2 i Valdanos 4 zabilježena je infestacija od 6,6% (jaja i L1), na lokalitetu Bar 3 od 10% (jaja, L1 i lutke u istom odnosu), a na lokalitetu Valdanos 1 od 13,3% (jaja, L2 i L3 u istom odnosu).

S obzirom na to da je u plodovima prisutna aktivna infestacija, maslinarima se preporučuje da urade hemijski tretman cijele krošnje preparatom na bazi flupiradifurona (**Sivanto Prime**). Primjenjuje se kasno uveče, kada je temperatura ispod 25 °C, i može se primijeniti samo jednom u vegetaciji.

Kao alternativa protiv odraslih muva (tamo gdje još nema infestacije ili je niska), preporučuje se preparat **Success Bait** – to je spinosad sa atraktantom koji privlači odrasle muve, a tretira se samo jedna grana sa južne strane svakog stabla.

Takođe, može se primijeniti **kaolinska glina (kaolin)** kao mehanička zaštita, gdje se praktično okupa cijelo stablo. Na plodovima se stvara zaštitni sloj koji onemogućava muvama da polažu jaja.

S poštovanjem,

Izveštaj pripremila

Prof. dr Snježana Hrnčić

Dekan

Prof. dr Igor Pajović