

Na osnovu člana 17 stav 2 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 39/04 i 23/05 i " Službeni list CG", broj 14/12), na predlog Ministarstva zdravlja, Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ donijela je

ODLUKU O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LJEKOVA

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se osnovna lista lijekova koja, saglasno zakonu, sadrži lijekove koji su od posebnog značaja za zdravlje osiguranih lica i koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 2

Osnovna lista lijekova sadrži sljedeće podatke:

- 1) šifru anatomske - terapijske - hemijske (ATC) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO);
- 2) internacionalni nezaštićeni naziv (generičko ime) lijeka (INN);
- 3) farmaceutski oblik lijeka;
- 4) oznake režima propisivanja i primjene lijeka;
- 5) indikacije za koje se određeni lijek može propisivati; i
- 6) oblik, jačinu i pakovanje lijeka.

Član 3

Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja u izuzetnim slučajevima, kod teških patoloških stanja, rijetkih bolesti, nastavka terapije propisane pri liječenju u inostranstvu, može da odobri primjenu lijeka koji nije na osnovnoj listi lijekova, na osnovu mišljenja konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore i mišljenja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Član 4

Osnovna lista lijekova data je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore«.

Broj:

Podgorica, 7.novembra 2014. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

Milo Đukanović

OSNOVNA LISTA LJEKOVA

LJEKOVI KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblici	Režim propisivanja i primjene	Jačina lijeka
A	LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM			
A01	STOMATOLOŠKI LJEKOVI, LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI USNE ŠUPLJINE			
A01AA01	natrijum fluorid	tablete	R	0,25mg; 1mg
A01AB09	mikonazol	oralni gel	R;SZ	2% 40g
A01AB12	heksetidin	rastvor	SZ	(1 mg / ml) 200 ml
indikacije	samo u jedinicama intenzivne njege			
A02	LJEKOVI ZA LIJEČENJE POREMEĆAJA ACIDITETA, ULKUSNE BOLESTI I SA DJELOVANJEM NA PERISTALTIKU			
A02BA02	ranitidin	injekcije	Z; SZ	50mg
		tablete	R; SZ	150 mg; 300 mg
indikacije:	za šifre MKB: K25-K28, najduže mjesec dana tokom godine, osim za profilaksu ulkusa kod primjene kortikosteroida i citostatske terapije, kada se primjena odobrava dok traje terapija kortikosteroidima ili citostaticima za šifru MKB: K30 terapija do 8 nedelja u toku 12 mjeseci, po predlogu specijaliste interniste ili gastroenterologa			
A02BA03	famotidin	tablete	R; SZ	20mg; 40mg
indikacije:	za šifre MKB: K25-K28, najduže mjesec dana tokom godine, osim za profilaksu ulkusa kod primjene kortikosteroida i citostatske terapije, kada se primjena odobrava dok traje terapija kortikosteroidima ili citostaticima za šifru K30 terapija do 8 nedelja u toku 12 mjeseci, po predlogu specijaliste interniste ili gastroenterologa			
A02BC01	omeprazol	kapsule	R; SZ	20mg
indikacije:	za kapsule: za šifre MKB: K22.1, K25-K28, u slučaju rezistencije na H2 blokatore, najduže mjesec dana tokom godine, osim za šifru E16.8 kada je primjena vremenski neograničen. Terapija se može sprovoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u toku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obavezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.			
A02BC02	pantoprazol	prašak za injekcije	SZ	40mg
		tablete	RZ;SZ	20mg; 40mg
indikacije:	za tablete: kao nastavak parenteralne terapije, na osnovu otpusne liste, za šifre MKB: K22.1; K25-K28 i K85, najduže mjesec dana, osim za šifru E16.8, kada je primjena vremenski neograničena. za injekcije: najduže tri dana u jedinicama intenzivne njege, te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sistema			
A02BC05	esomeprazol	injekcije	SZ	40mg
indikacije	sprječavanje rekrvaranja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dijela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sljedeća dva dana do 4 ampule po danu)			
A03	LJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE			
A03B	ALKALOIDI BELADONE I DERIVATI, MONOKOMPONENTNI			
A03BA01	atropin	injekcije	Z;SZ	1mg/ml
A03BB01	hioscin butilbromid (skopolamin)	injekcije	Z;SZ	20mg/ml
A03F	PROPULZIVI			
A03FA01	metoklopramid	sirup	R;SZ	5mg/5ml
		tablete	R;SZ	10mg
		injekcije	Z;SZ	10mg/2ml

A04	ANTIEMETICI I LJEKOVI ZA SUZBIJANJE NAUZEJE		
A04AA01 indikacije:	ondansetron za suzbijanje povraćanja uzrokovanog citostaticima, za MKB: C00-C97	injekcije	SZ 4mg/2ml; 8mg/4ml
A04AA02 indikacije:	granisetron samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog emetogenim lijekovima (citostaticima), za MKB: C00-C97.	tableta injekcije	RS;SZ 1mg; 2mg SZ 1mg/ml; 3mg/3ml
A04AA05 indikacije:	palonosetron hlorid prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa, za MKB: C00-C97.	rastvor za inj.	SZ 250mcg/5ml
A05	LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE		
A05AA02 indikacije:	urzodeoksiholna kiselina 1.patohistološki dijagnostifikovana primarna bilijarna ciroza : za MKB - K74.3 2. primarni sklerozirajući holangitis : za MKB - K83.0 Po predlogu specijaliste gastroenterologa Kliničkog centra Crne Gore	kapsule	RS;SZ 250mg
A05BA... indikacije:	L-ornitin, L-aspartat za šifru MKB: K72	koncentrat za infuziju granule	SZ 5g/10ml RS;SZ 3g
A06	LAKSATIVI		
A06AB02	bisakodil	dražeje supozitorije	SZ 5mg SZ 10mg
A06AD11 indikacije:	laktuloza za šifre MKB: K70 - K74	sirup	RS;SZ 200ml;250ml;500ml;
A07	ANTIDIJAROICI I LJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM		
A07AA02	nistatin	kapi	RS;SZ 100 000i.j./ml
A07BA01	medicinski ugalj	granule	Z; SZ 50 g / 19,25 g
A07DA03	loperamid	tablete kapsule	RS;SZ 2mg RS;SZ 2mg
A07EA06 indikacije:	budesonid Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona za MKB: K50 lijek se u terapiju uvodi do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja specijaliste gastroenterologa, a nastavak terapije još 3 mjeseca u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja specijaliste gastroenterologa.	kapsula tvrda gastrozistentna	RS;SZ 3 mg
A07EC01 indikacije:	sulfasalazin za šifre MKB: K50, K51 i M05	tablete	RS;SZ 500mg
A07EC02 indikacije:	mesalazin za šifre MKB: K50, K51 i M05	tablete supozitorije mikroklizme granule	RS;SZ 250mg; 400mg; 500mg RS;SZ 250mg; 500mg RS;SZ 4g/60ml RS;SZ 1000mg;500mg
A07FA01	bacillus subtilis IP 5832 samo za djecu do 18 godina	kapsule	R;SZ 35mg
A09	LJEKOVI ZA OLAKŠAVANJE PROBAVE (ENZIMI)		
A09AA02 indikacije:	enzimi pankreasa (visoko dozirani) za šifru MKB: E84	kapsule	RS;SZ 150mg pankreatina (10 000 j. lipaze+ 8000 j. amilaze + 600 j. proteaze) 300mg pankreatina (25 000 j. lipaze + 18 000 j. amilaze + 1000 j. proteaze) 400mg pankreatina (25 000 j. amilaze + 40 000 j. lipaze + 1600 j. proteaze)
A10	LJEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)		
A10AB	INSULINI I ANALOZI BRZOG DEJSTVA		
A10AB01	humani insulini	karpula špric injekcije pen rastvor za injekciju	RS; Z;SZ (100i.j./ml) 3ml; RS; Z;SZ (100i.j./ml) 3ml; RS; Z;SZ (100i.j./ml) 3ml; RS; Z;SZ (100i.j./ml) 3ml;

A10AB04	insulin lispro	karpula	RS; Z;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		rastvor za injekciju	RS; Z;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
A10AB05	humani aspart	karpula	RS; Z;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		špric	RS; Z;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		rastvor za injekciju	RS; Z;SZ	(100i.j./ml)10ml;
A10AB06	insulin glulizin	karpula	RS; Z;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		rastvor za injekciju	RS; Z;SZ	(100i.j./ml) 10 ml;
		injekcije špric	RS; Z;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
A10AC	INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA			
A10AC01	humani izofan insulin	karpula	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		špric	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
A10AD	INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA U KOMBINACIJI SA INZULINIMA BRZOG DEJSTVA			
A10AD01	humani insulini brzog dejstva sa izofan insulinom(30%+70%)	karpula	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		špric	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
A10AD01	humani insulini brzog dejstva sa izofan insulinom(25%+75%)	karpula	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		inj. (špric)	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		bočica	RS;SZ	(100i.j./ml) 5ml
A10AD05	insulin aspart sa protamin insulinom (30%+70%)	karpula	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		špric	RS;SZ	(100i.j./ml) 3 ml;
A10AE	INSULINI I ANALOZI DUGOG DEJSTVA			
A10AE04	insulin glargine	rastvor za injekciju	RS;SZ	(100i.j./ml) 10ml;
		karpula	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		špric	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
A10AE05	insulin detemir	karpula	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
		rastvor za injekciju	RS;SZ	(100i.j./ml) 3ml;
A10B	ORALNI ANTIDIJABETICI			
A10BA02	metformin	tablete	R;SZ	500mg; 850mg; 1000mg
A10BB09	gliklazid	tablete	R;SZ	80mg
		tableta sa modif. oslob.	R;SZ	60mg
A10BB12	glimepirid	tablete	R;SZ	1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg
A10BH01 indikacije:	sitagliptin za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijete i tjelovježbi- 1. Dodatna terapija standardnim antidijabetičima kod bolesnika s neregulisanom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Monoterapija- za bolesnike kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola, a kod kojih je metformin neodgovarajuća terapija zbog nepodnošljivosti ili je kontraindikovana. 3. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.	film tablete	RS SZ	50mg,100mg
A10BH02	vildagliptin	tablete	RS;SZ	100mg
A10BH02 indikacije:	za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijete i tjelovježbi- 1. Dodatna terapija standardnim antidijabetičima kod bolesnika s neregulisanom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Monoterapija- za bolesnike kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola, a kod kojih je metformin neodgovarajuća terapija zbog nepodnošljivosti ili je kontraindikovana. 3. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.			
A10BH03	saksagliptin	film tablete	RS;SZ	5mg
A10BH03 indikacije:	za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijete i tjelovježbi- 1. Dodatna terapija standardnim antidijabetičima kod bolesnika s neregulisanom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.			

A11	VITAMINI		
A11C	VITAMINI A I D, UKLJUČUJUĆI NJIHOVE KOMBINACIJE		
A11CB...	retinol + ergokalciferol	kapi	R;SZ 10ml
A11CC03 indikacije:	alfakalcidol za šifre MKB: E20; M80; M81; N18; po predlogu specijaliste endokrinologa, reumatologa ili nefrologa	kapsule	RS;SZ 0,25mcg, 0,5 mcg, 1 mcg
A11CC04 indikacije:	kalcitriol za šifre MKB: K72, N18	kapsule	RS;SZ 0,25mcg; 0,5mcg
A11CC05	holekalciferol	kapi	RS;SZ 10ml
A11CC07 indikacije:	parikalcitol za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika na hemodijalizi po predlogu Konzilijuma nefrologa Kliničkog centra Crne Gore nastavak terapije na primarnom nivou	rastvor za inj/inf	SZK 5mcg/ml
A11D	VITAMIN B1 MONOKOMPONENTNI I U KOMBINACIJI SA VITAMINIMA B6 I VITAMINOM B12		
A11DA01	tiamin	ampule	Z;SZ 100mg/ml; 250mg/2ml
A11G	ASKORBINSKA KISELINA (VITAMIN C), UKLJUČUJUĆI KOMBINACIJE		
A11GA01	askorbinska kiselina	ampule	Z;SZ 500mg/5ml
A11H	OSTALI MONOKOMPONENTNI VITAMINSKI PREPARATI		
A11HA02	piridoksin	ampule	Z;SZ 50mg/2ml; 250mg/5ml
A12	MINERALI		
A12AA02	kalcijum glukonate (gluconate)	ampule	Z;SZ 10% 10ml
A12AA04	kalcijum karbonat	tablete	R;SZ 1g
A12BA01	kalijum hlorid	tablete	R;SZ 1g
		prašak	R;SZ 1g
A12CC02	magnezijum sulfat	ampule	SZ 10%; 20%; 50%
B	LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KRV I KRVOTVORNIH ORGANA		
B01	ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)		
B01AA03	varfarin	tablete	RS;SZ 5mg
B01AA07	acenokumarol	tablete	RS;SZ 4mg
B01AB	HEPARINI		
B01AB01	heparin	injekcije	Z;SZ 5000ij; 25 000ij
B01AB02	antitrombin III	prašak za injekcije	SZ 500i.j.; 1000i.j.
B01AB04 indikacije za SZ: indikacije za Z:	dalteparin 1. prije i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 3. liječenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 1. liječenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primjenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procjene odgovarajućeg specijaliste	rastvor za injekciju	Z;SZ 2500i.j.; 5000i.j.; 10000i.j.
B01AB05 indikacije za SZ:	enoksaparin 1. prije i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 3. liječenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 4. liječenje pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	injekcije	Z;SZ 2000ij; 4000ij; 6000ij; 8000ij; 10000ij

indikacije za Z:	1. liječenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primjenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procjene odgovarajućeg specijaliste 2. profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom <u>Profilaksu enoksaparinom ne treba primjenjivati u prvom trimestru trudnoće.</u>		
B01AB06 indikacije za SZ: indikacije za Z:	nadroparin 1. prije i postoperacijska profilaksa tromboembolije visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk i koljeno) 2. tromboembolijski incidenti i prevencija zgrušavanja tokom hemodijalize 3. nestabilna angina pectoris i ne-Q infarkt miokarda ambulantno liječenje tromboze dubokih vena (postavljena dijagnoza), a bolesnici nijesu hospitalizovani, do 7 dana terapije	injekcije	Z;SZ 2850 ij; 3800 ij; 5700ij; 7600 ij
B01AC	INHIBITORI AGREGACIJE TROMBOCITA (IZUZEV HEPARINA)		
B01AC04 indikacije:	klopidogrel kod bolesnika poslije ugradnje grafta ili stenta, do 12 mjeseci	tablete	RZ;SZ 75mg
B01AC05 indikacije:	tiklopidin kod dokazane nepodnošljivosti na acetil salicilnu kiselinu uz preporuku interniste ili neurologa	tablete	RS;SZ 250mg
B01AC06	acetil salicilna kiselina	tablete	SZ 100mg
B01AD	ENZIMI		
B01AD01	streptokinaza	prašak za infuzije	SZ 750 000 i.j.; 1 500 000 i.j.
B01AD02	alteplaza	lio bočica	SZK 50 mg
B01AE07 indikacija:	dabigatraneteksilat 1. prevencija venske tromboembolije, kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamjene kuka ili koljena 2. prevencija moždanog udara i sistemske embolije, kod odraslih pacijenata sa navalvularnom atrijskom fibrilacijom sa jednim ili više faktora rizika	tvrdi kapsula	RS;SZ 75mg;110mg; 150mg
B01AX06 indikacija:	rivaroksaban prevencija venske tromboembolije kod odraslih bolesnika, koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamjene kuka ili koljena	film tablete	SZ 10mg
B02	ANTIHEMORAGICI (LJEKOVI KOJI POSPJEŠUJU MEHANIZAM ZGRUŠAVANJA KRVII)		
B02AA02 indikacija:	traneksaminska kiselina 1. za liječenje bolesnika sa hemofilijom A i B, sa von Willenbrandovom bolesti i bolesnika sa drugim nasljednim koagulopatijama po predlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore 2. kao antifibrinolitik po predlogu Konzilijuma kardiohirurga Kliničkog centra Crne Gore	ampule	SZ 100mg/ml;500mg/ml
B02BA01	fitomenadion	injekcije	SZ 2mg/0,2ml; 10mg/ml
B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	ljepilo za tkivo	SZ 1ml; 3ml; 4ml; 5ml
	humani fibrinogen, humani trombin	medicinski sundjer	SZ 3.0cmx2,5cm; 9.5cmx4,8cm
B02BD01	koagulacioni faktori II,VII,IX,X "	lio bočica	200i.j.; 250i.j.; 500i.j; 600i.j.
B02BD02	koagulacioni faktor VIII	prašak za injekcije	SZ 250ij; 500ij; 1 000ij
B02BD04	koagulacioni faktor IX	prašak za injekcije	SZ 200i.j.; 500i.j.; 600i.j; 1 200i.j.
B02BD07	koagulacioni faktor XIII	lio bočica	SZ

B03	ANTIANEMICI			
B03AA02	gvožđe II - fumarat	kapsule	R;SZ	350 mg
B03AB05	gvožđe III hidroksid polimaltoza	sirup	R;SZ	50mg/5ml
		tablete za žvakanje	R;SZ	100mg
B03AB09	gvožđe III protein sukcinilat	sirup	R;SZ	40mg/15ml
indikacije:	za šifru MKB: D50, kod djece do 15 godina			
B03BB01	folna kiselina	tablete	R;SZ	5mg
B03BA03	hidroksikobalamin	injekcije	Z;SZ	2,5mg/2ml
indikacije:	za šifru MKB: D51			
B03XA01	epoetin alfa	ampule	Z;SZ	1000i.j.; 2000i.j.; 3 000.J.;; 4000i.j.; 10 000i.j.
indikacije:	za šifru MKB:N18 i anemije kod maligniteta			
B03XA01	epoetin beta	ampule	Z;SZ	2000i.j.; 5 000.J.;;
indikacije:	za šifru MKB:N18 i anemije kod maligniteta			
B03XA02	darbepoetin alfa	rastvor za inj(pen sa uloškom)	Z; SZ	10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml);30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml);20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml);40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml);50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)
indikacije:	za MKB:N18 primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza za bubrežnu anemiju s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L,			
B03XA03	metoksi polietilenglikol-epoetin beta	rastvor za injekciju	Z;SZ	50mcg / 0,3ml; 75 mcg /0,3 ml; 100mcg /0,3 ml; 120mcg/0,3ml;200mcg/0,3ml
indikacije:	za MKB:N18 kod bolesnika sa anemijom u bubrežnoj insuficijenci ji (vrijednost klirensa kreatinina £ 50ml/min) u pred-dijaliznom periodu, tokom dijalize i post-transplantaciono sa vrijednostima hemoglobina nižim od 90 gr/l za po četak trapije, a za održavanje 110gr/l Prije primjene obavezno je korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvož da, vitamina, drugih nutritivnih faktora,zaustaviti krvarenje).			
B05	SREDSTVA ZA ZAMJENU KRV I PERFUZIONI RASTVORI			
B05AA01	humani albumin	infuzije	SZ	5%(100ml; 250ml; 350ml; 500ml); 20%(10ml,50ml,100ml)
B05AA05	dekstran 40 u fiziološkom rastvoru	infuzije	SZ	(10%+0,9%) 500ml
B05AA06	želatinski polimerizat	infuzije	SZ	3,5% 500ml
B05AA07	hidroksietilskrob, natrijum hlorid	infuzije	SZ	(6%+0,9%) 500ml
B05BA02	ulje soje, fosfolipidi jajeta, glicerol	infuzija boca	SZ	250 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
		infuzija boca	SZ	500 ml (20%. 1,2% 2,25%)
		infuzija kesa	SZ	250 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
		infuzija kesa	SZ	500 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
		infuzija boca	SZ	100 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
		infuzija kesa	SZ	100 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
		infuzija	SZ	500 ml (10% + 2,5% + 0,6%)
B05BA03	glukoza	injekcije	Z;SZ	(25%;37%;50%) 10ml;
		infuzije	Z;SZ	5%; 10%;
B05BA03	fruktoza	infuzije	SZ	(5%;10%) 500ml
B05BA10	aminokiseline (i kombinacija sa vitaminima i mineralima i dr.)	infuzije	SZ	100ml; 250ml; 500ml
B05BB01	natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid	infuzije	Z;SZ	500ml
B05BB01	Na+K+Ca+Mg+Cl+laktat	infuzije	Z;SZ	500ml
B05BB01	natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijumhlorid + natrijum laktat	infuzije	Z;SZ	500ml
B05BB02	natrijum hlorid+glukoza	infuzije	Z;SZ	500ml
B05BC01	manitol	infuzije	Z;SZ	(10%;20%) 250ml; 500ml
B05CX10	manitol, sorbitol	rastvor	Z;SZ	(0,54%+2,7%) 5l
B05DB...	rastvori za peritonealnu dijalizu	rastvor	Z;SZ	
B05XA01	kalijum hlorid	infuzije	Z;SZ	7,40%
B05XA02	natrijum hidrogenkarbonat	infuzije	Z;SZ	8,40%
B05XA03	natrijum hlorid	infuzije	Z;SZ	(0,9%) 10ml; 100ml; 250ml; 500ml; 1000ml (10%) 100ml (0,45%) 250ml; 500ml
B05ZA	koncentrovani rastvori za hemodijalizu	konc.rastvor	Z;SZ	

C	LJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM			
C01	TERAPIJA BOLESTI SRCA			
C01A	KARDIOTONICI			
C01AA05	digoksin	tablete	R;SZ	0,25mg
		injekcije	Z;SZ	0,25mg/2ml
C01B	ANTIARITMICI			
C01BB01	lidokain	ampule	Z;SZ	2% 2ml
C01BC03	propafenon	tablete	RS;SZ	150mg; 300mg
C01BC03	propafenon	injekcije	Z;SZ	35mg/10ml
C01BD01	amjodaron	injekcije	SZ	150mg/3ml
		tablete	RS;SZ	200mg
C01C	LJEKOVI KOJI DJELUJU NA STIMULACIJU RADA SRCA			
C01CA01	etilefrin	injekcije	SZ	10mg/ml
C01CA02	noradrenalin primjena u Centru za kardiohirurgiju, Centru za kardiologiju i jedinicama intenzivne njege, po predlogu Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore	ampule	SZ	1mg/ml(2mg)
C01CA04	dopamin	koncentrat za infuziju		50mg/5ml; 200mg/10ml;250mg /50ml;500mg/50ml
C01CA06	fenilefrin primjena u Centru za kardiohirurgiju i Centru za kardiologiju, po predlogu Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore	ampule	SZ	10mg/ml
C01CA07	dobutamin	koncentrat za infuziju		250mg/20ml
C01CA19	fenoldopam primjena u Centru za kardiohirurgiju po predlogu Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore	ampule	SZ	10mg/ml(2ml)
C01CA24	adrenalin (epinefrin)	injekcije	Z;SZ	1mg/ml
C01CE02	milrinon primjena u Centru za kardiohirurgiju, Centru za kardiologiju i Institutu za bolesti djece, po predlogu Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore	ampule	SZ	10mg/10ml
C01D	VAZODILATATORI- LJEKOVI ZA LIJEČENJE ANGINE PEKTORIS			
C01DA02	gliceriltrinitrat	lingvalet	R; Z;SZ	0,5mg
		injekcije	SZ	5mg
		oralni aerosol	RS;SZ	12,2ml/200 doza (0,4mg/doza)
C01DA14	izosorbid-5-mononitrat	tablete	R;SZ	20mg; 40mg
		kapsule	R;SZ	40mg
C01E	OSTALI LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SRCE			
C01EA01 indikacije	alprostadil samo za održavanje prohodnosti Ductus Bo tali kod novorođenčadi sa urođenom srčanom manom prije operacije primjena u Institutu za bolesti djece, po predlogu Konzilijuma pedijatara Kliničkog centra Crne Gore	ampule	SZ	0,5 mg/ml
C01EB10	adenozin primjena u Centru za kardiohirurgiju, Centru za kardiologiju, Institutu za bolesti djece i jedinicama intenzivne njege Kliničkog centra Crne Gore po predlogu Konzilijuma	ampule	SZ	6mg/2ml
C02	ANTIHIPERTENZIVI			
C02AB02	metildopa	tablete	R;SZ	250mg
C02AC01	klonidin primjena u Centru za kardiohirurgiju i jedinicama intenzivne njege, po predlogu Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore	ampule	SZ	150 mcg
C02CA04	doksazosin	tablete	R;SZ	1mg; 2mg; 4mg
C02CA06	urapidil	injekcije	SZ	25mg/5ml; 50mg/10ml
C03	DIURETICI			
C03AA03	hidrohlortiazid	tablete	R;SZ	25mg
C03BA11	indapamid	tablete	R;SZ	2,5mg
C03CA01	furosemid	tablete	R;SZ	40mg
		injekcije	Z;SZ	20mg/2ml; 250mg/10ml
C03DA01	spironolakton	tablete	R;SZ	25mg; 100mg
C03EA12	amilorid, metiklotiazid	tablete	R;SZ	10mg+5mg
C07	BLOKATORI BETAADRENERGIČKIH RECEPTORA			
C07AA05	propranolol	tablete	R;SZ	40mg

C07AA07 indikacije:	sotalol kao antiaritmik za šifre MKB: I47; I48; I49	tablete	RS;SZ	80mg
C07AB02	metoprolol	injekcije	Z;SZ	5mg/5ml
C07AB03	atenolol	tablete	R;SZ	50mg;100mg
C07AG02	karvedilol	tablete	R;SZ	25mg; 50mg; 100mg
C08	BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA			
C08CA01	amlodipin	tablete	R;SZ	5mg; 10mg
C08CA05	nifedipin	tablete	R;SZ	20mg
		kapsule	R;SZ	20mg
C08CA06 indikacije:	nimodipin za šifru MKB: I 60	infuzije	SZ	10mg/50ml
C08DA01	verapamil	injekcije	Z;SZ	5mg/2ml
		tablete	R;SZ	40mg; 80mg
C08DB01	diltiazem	tablete	R;SZ	90mg
C09	LJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN – ANGIOTENZIN SISTEM			
C09A	BLOKATORI KONVERTAZE (ACE- INHIBITORI), MONOKOMPONENTNI			
C09AA01	kaptopril	tablete	R;SZ	12,5mg; 25mg; 50mg
C09AA02	enalapril	tablete	R;SZ	10mg; 20mg
C09AA03	lizinopril	tablete	R;SZ	5mg; 10mg; 20mg
C09AA05	ramipril	tablete	R;SZ	2,5mg; 5mg
C09AA06	kvinapril	tablete	R;SZ	10mg; 20mg
C09AA08	cilazapril	film tablete	R;SZ	2,5mg; 5mg
C09AA09	fosinopril	tablete	R;SZ	10mg; 20mg
C09B	ACE - INHIBITORI, KOMBINACIJE			
C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	tablete	R;SZ	(10mg+12,5mg); (10mg+25mg)
C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	tablete	R;SZ	(10mg+12,5mg); (20mg+12,5mg)
C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	tablete	R;SZ	(2,5mg+12,5mg); (5mg+25mg)
C09BA06	kvinapril, hidrohloriazid	tablete	R;SZ	(20 mg + 12,5 mg)
C09BA09	fosinopril, hidrohloriazid	tablete	R;SZ	(20mg+12,5mg)
C09C	ANTAGONISTI RECEPTORA ANGIOTENZINA II, MONOKOMPONENTNI			
C09CA01 indikacije:	losartan za liječenje arterijske hipertenzije (za šifre MKB: I10, I11) ukoliko se tromjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasnim. Za bolesnike koji ne podnose ACE –inhibitore, po predlogu specijaliste kardiologa	tablete	RS;SZ	50 mg; 100 mg
C09D	ANTAGONISTI RECEPTORA ANGIOTENZINA II, KOMBINACIJE			
C09DA01 indikacije:	losartan, hidrohloriazid za liječenje arterijske hipertenzije (za šifre MKB: I10, I11) ukoliko se tromjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasnim. Za bolesnike koji ne podnose ACE –inhibitore, po predlogu specijaliste kardiologa.	tablete	RS;SZ	(50 mg+12,5 mg)
C10	SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)			
C10A	LJEKOVI KOJI SMANJUJU NIVO HOLESTEROLA I TRIGLICERIDA			
C10AA01	simvastatin 1. akutni infarkt miokarda MKB:I21-kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda 2. infarkt mozga i MKB:I63- samo za pacijente koji su imali infarkt mozga-kao prevencija ponovnog infarkta mozga	tablete	RS;SZ	10mg; 20mg; 40mg
C10AA03	pravastatin 1. akutni infarkt miokarda MKB:I21 – kao hronična terapija, nakon preležanog akutnog infarkta miokarda-kao prevencija ponovnog infarkta miokarda 2. infarkt mozga MKB:I63 – samo za pacijente, koji su imali infarkt mozga-kao prevencija ponovnog infarkta mozga	tablete	RS SZ	20mg; 40mg

C10AA05 indikacije:	atorvastatin	film tablete	RS SZ	10mg; 20mg
	1. akutni infarkt miokarda MKB:I21 – kao hronična terapija, nakon preležanog akutnog infarkta miokarda-kao prevencija ponovnog infarkta miokarda 2. infarkt mozga MKB:I63 – samo za pacijente, koji su imali infarkt mozga-kao prevencija ponovnog infarkta mozga			
C10AB	FIBRATI			
C10AB08	ciprofibrat	kapsule	R;SZ	100mg
D	DERMATOLOGICI-LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA			
D01	ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU			
D01AA01	nistatin	mast	R;SZ	100 000ij/g
D01AC	DERIVATI IMIDAZOLA I TRIAZOLA			
D01AC01	klotrimazol	krem	R;SZ	1%
D01AC02	mikonazol	krem	R;SZ	2%
D06	ANTIBIOTICI I HEMOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU			
D06AX30	bacitracin, neomicin	sprej	Z;SZ	150ml
		mast	R;SZ	30g
		prašak	R;SZ	5g; 50g
D06BA01	sulfadiazin srebro	krem	Z;SZ	1%
D06BB03	aciklovir	krem	R;SZ	5%
		mast	R;SZ	5%
D07	KORTIKOSTEROIDIZA PRIMJENU U LIJEČENJU KOŽNIH BOLESTI			
D07AC04	fluocinolon acetonid	krem	R;SZ	0,025%
		mast	R;SZ	0,025%
		gel	R;SZ	0,025%
D08	ANTISEPTICI I DEZIFICIJENSI			
D08AG02	povidon jod	rastvor	Z;SZ	10%
		pjena	Z;SZ	7,50%
G	LJEKOVI ZA LIJEČENJE GENITO-URINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI			
G01	LJEKOVI SA ANTIINFEKTIVIM I ANTISEPTIČKIM DJELOVANJEM NA GINEKOLOŠKU PRIMJENU			
G01AA51	nistatin, neomicin, polimiksin	vaginalete	RS;SZ	(100000+35000+35000ij)
G01AF01	metronidazol	vaginalete	RS;SZ	500mg
G01AF02	klotrimazol	vaginalete	RS;SZ	200mg
G01AX11	povidon jod	vaginalete	RS;SZ	200mg
G02	OSTALI GINEKOLOŠKI PREPARATI			
G02A	UTEROSTIPTICI I PROSTAGLANDINI			
G02AB01	metilergometrin	injekcije	Z;SZ	0,1mg/ml; 0,2mg/ml
		kapi	RS;SZ	(0,25mg/ml) 10ml
G02AD02	dinoproston	gel	SZ	0,5mg/3g
		vaginalete	SZ	3mg
G02AD04	karboprost	injekcije	SZ	0,25mg/ml
G02C	BETAADRENERGIČNI AGONISTI			
G02CA	heksoprenalin	injekcije	Z;SZ	0,01mg/4ml
G02CB01	bromokriptin	tablete	RS;SZ	2,5mg
G03	POLNI HORMONI I OSTALI LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA POLNI SISTEM			
G03AA07	etinilestradiol, levonorgestrel	tablete	RS;SZ	0,03mg+0,15mg
G03BA03	testosteron	injekcije	Z;SZ	250mg/ml; 1000mg/4ml
G03CA03	estradiol	injekcije	Z;SZ	10mg/ml
G03DA03	hidroksiprogesteron	injekcije	Z;SZ	250mg/ml
G03DA04 indikacije:	progesteron 1. prijevremeni porođaj, MKB: O60 2. prijevremeni pobačaj, MKB: O20.0 po predlogu specijaliste ginekologa	kapsula meka	RS;SZ	100mg; 200mg
G03DC03	linestrenol	tablete	RS;SZ	5mg
G03GA01	horiogonadotropin	prašak za injekcije	SZ	1500i.j.; 5000i.j.
G03GA02 indikacije:	menotropin do 2250 i.j. kao terapija za tri postupka vanjske oplodnje	injekcije	SZ	75ij+75ij
G03GA05 indikacije:	folitropin alfa do 2250 i.j. kao terapija za tri postupka vanjske oplodnje	pen injekcije	SZ	300ij; 900ij

G03GA06 indikacije:	folitropin beta do 2250 i.j. kao terapija za tri postupka vanjtelesne oplodnje	injekcije	SZ	50ij; 100ij
G03HA01	ciproteron	tablete	RS;SZ	50mg
G04	UROLOŠKI LJEKOVI			
G04B	OSTALI UROLOŠKI LJEKOVI UKLJUČUJUĆI ANTISPASMOTIKE			
G04BE03 indikacije:	sildenafil za liječenje bolesnika sa uznapredovalom plućnom hipertenzijom kod kojih postoji insuficijencija srca – III stepen, a koji više ne reaguju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijumovih kanala po predlogu Konzilijuma kardiologa ili pulmologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	20mg
G04BD09	trospijum	injekcije	Z;SZ	0,2mg
		tablete	R;SZ	5mg
G04C	LJEKOVI U TERAPIJI BENIGNE HIPERTROFIJE PROSTATE			
G04CB01	finasterid	tablete	RS;SZ	5mg
H	HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE			
H01	HORMONI HIPOFIZE, HIPOTALAMUSA I ANALOZI			
H01A	HORMONI PREDNJEG REŽNJA HIPOFIZE			
H01AC01 indikacije:	somatropin 1.nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta MKB: E23.0, samo kod djece do 18 godina starosti; 2 Turnerov sindrom MKB: Q96, samo kod djece do 18 godina starosti; 3.kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti MKB: E23.0	injekcije	RS;SZ	5mg/1,5ml; 10mg/1,5ml; 15mg/1,5ml; 5,3mg/1ml; 12mg/1ml; 6mg/3ml
H01AC01 indikacije:	somatropin - biološki sličan lijek 1. nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta MKB: E23.0, samo kod djece do 18 godina starosti; 2. Turnerov sindrom MKB: Q96, samo kod djece do 18 godina starosti; 3. kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti MKB: E23.0 po predlogu ljekara specijaliste za: - pacijente kojima se prvi put uvodi biološka terapija - pacijente koji se prevode na terapiju biološki sličnim lijekom	injekcije	RS;SZ	5mg/1,5ml; 10mg/1,5ml; 15mg/1,5ml;
H01B	HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE			
H01BA02 indikacije:	dezmpresin primarno noćno mokrenje (F98.0), po predlogu dječijeg endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RS;SZ	0,2mg
		nazalni sprej	RS;SZ	0,1mg/ml
		injekcije	SZ	4mcg/0,5ml;20mcg/ml;40mcg/ml
H01BB02	Oksitocin	injekcije	SZ	5 i.j./ml; 10 i.j./ml
H01C	HORMONI HIPOTALAMUSA			
H01CA01 indikacije:	gonadorelin 1.retencija testisa kod djece do 3 godine 2.dijagnostika preranog puberteta za šifre MKB: C75.1; D35.2; E34.0; I85 ; K85	injekcije	SZ	
H01CB02 indikacije:	oktreotid za šifre MKB: C75.1; D35.2; E22.0; E34 .0; I85; K29.0; K85	injekcije	Z	0,1mg/ml
H01CB02 indikacije:	oktreotid 1. akromegalija 2. karcinoidni tumori po predlogu Konzilijuma endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore. Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou	prašak za injekcije	SZ	10mg, 20mg, 30mg

H01CB03 indikacije:	lanreotid 1. akromegalija 2. karcinoidni tumori po predlogu Konzilijuma endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore. Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou	injekcije	SZ	60mg; 90mg; 120mg
H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
H02AB01	betametazon dinatrijum fosfat, betametazon dipropionat	injekcije	Z;SZ	(2mg+5mg)/ml
H02AB02	deksametazon	tablete	R;SZ	0,5mg
		injekcije	Z;SZ	4mg/ml
H02AB04	metilprednizolon	tablete	R;SZ	4mg; 8mg; 32mg;
		injekcije	Z;SZ	20mg; 40mg; 125mg; 500mg
H02AB07	prednizon	tablete	R;SZ	5mg; 20mg
H02AB09	hidrokortizon	tablete	R;SZ	5mg;10mg;
		injekcije	SZ	100mg; 250mg; 500mg
H03	LJEKOVI ZA LIJEČENJE TIROIDEJE			
H03A	PREPARATI TIROIDEJE			
H03AA01	levotiroksin	tablete	R;SZ	0,025mg; 0,05mg; 0,075mg;
		tablete	R;SZ	0,1mg; 0,125mg; 0,15mg
H03B	ANTITIREOIDNI PREPARATI			
H03BA02	propiltiouracil	tablete	R;SZ	50mg;100mg
H03BB02	tiamazol	tablete	R;SZ	20mg
H04	LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA LUČENJE HORMONA PANKREASA			
H04AA01	glukagon	prašak za injekcije	Z;SZ	1mg
J	ANTIINFektivNI LJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
J01	ANTIBAKTERIJSKI LJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
J01A	TETRACIKLINI			
J01AA02	doksiciklin	tablete	R;SZ	100mg
		kapsule	R;SZ	100mg
		tablete za oralnu suspenziju	R;SZ	100mg
J01AA12 indikacije:	tigeciklin 1. komplikovane intra-abdominalne infekcije 2. komplikovane infekcije kože i mekih tkiva	rastvor za infuziju	SZ	50 mg
J01B	HLORAMFENIKOLI			
J01BA01#	hloramfenikol obavezan antibiogram	prašak za injekcije	SZ	1g
J01C	BETA - LAKTAMSKI PENICILINI			
J01CA01	ampicilin	prašak za injekcije	Z;SZ	1000mg
J01CA04	amoksicilin	sirup	R;SZ	250mg/5ml; 500mg/5ml
		kapsule	R;SZ	250mg; 500mg
		tablete disp.	R;SZ	500mg; 750mg; 1000mg
J01CE08	benzatin-benzilpenicilin	lio bočica	Z;SZ	600 000 i.j.; 1 200 000 i.j.; 2 400000 i.j.
J01CE10	benzatin- fenoksimetilpenicilin	sirup	R;SZ	750 000i.j./5ml; 1 000 000 i.j./ 6ml
		tablete	R;SZ	500 000 i.j.; 1 000 000 i.j. 1 500000i.j.
J01CE30	benzilpenicilin, prokain benz.penicilin	prašak za injekcije	Z;SZ	400 000 i.j.; 800 000 i.j.
J01CF02#	kloksacilin	sirup	RS;SZ	125mg/5ml
		kapsule	RS;SZ	250mg
		ampule	SZ	1g
indikacije:	infekcije sa osjetljivim stafilokokom koji stvara penicilinazu obavezan antibiogram			
J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	sirup	R;SZ	(125+31,25) mg/5ml; (250+62,5) mg/5ml; (400+57) mg/5ml
		prašak za injekcije	Z;SZ	(500+100) mg; (1000+200) mg;
indikacije:	1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 2. infekcije urogenitalnog trakta MKB: N30; N34; N36; N37; N39 3. infekcije srednjeg uha MKB: H65; H66	tablete	R;SZ	(250+125) mg; (500+125) mg; (875+125)mg
J01CR05 #	piperacilin, tazobaktam obavezan antibiogram	prašak za injekcije	SZ	(2g+0,25g); (4g+0,5g)

J01D	CEFALOSPORINI		
J01DB01	cefaleksin	sirup	R;SZ 250mg/5ml
		kapsule	R;SZ 250mg; 500mg
J01DB04	cefazolin	prašak za injekcije	SZ 1g
J01DC02	cefuroksim	prašak za injekcije	SZ 750mg; 1500mg
		tablete	R;SZ 250mg; 500mg
indikacije:	1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J41; J42 2. infekcije kože i mekog tkiva MKB: L00 - L08 3. infekcije urogenitalnog trakta MKB: N30; N34 4. lajmska bolest MKB: A69.2		
J01DD01#	cefotaksim	prašak za injekcije	Z;SZ 500mg; 1000mg; 2000mg
indikacije:	za Z, nakon bolničkog liječenja, kao nastavak terapije obavezan antibiogram		
J01DD02#	ceftazidim	prašak za injekcije	SZ 500mg; 1000mg
indikacije:	obavezan antibiogram		
J01DD04#	ceftriakson	prašak za injekcije	Z;SZ 250mg; 1000mg; 2000mg
indikacije:	za Z: nakon bolničkog liječenja, kao nastavak terapije obavezan antibiogram		
J01DD08	cefiksim	sirup	RS;SZ 100 mg/5 ml
		tablete	RS;SZ 400 mg
indikacije:	1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J41; J42; 2. zapaljenje srednjeg uha MKB: H66; 3. urinarne infekcije MKB: N00; N10; N30; N34;		
J01DE01#	cefepim	prašak za injekcije	SZ 500mg; 1000mg
indikacije:	obavezan antibiogram		
J01DH	KARBAPENEMI		
J01DH02#	meropenem	prašak za injekcije	SZ 500mg; 1000mg
indikacije:	obavezan antibiogram		
J01DH03#	ertapenem	prašak za infuzije	SZ 1g
indikacije:	obavezan antibiogram		
J01DH51#	imipenem, cilastatin	prašak za infuzije	SZ (500mg+500mg)
indikacije:	obavezan antibiogram		
J01E	SULFONAMIDI I TRIMETOPRIM		
J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	sirup	R;SZ (200mg+40mg)/5ml
		koncentrat za infuzije	SZ (400mg+80mg)/5ml
		tablete	R;SZ (400mg+80mg)
J01F	MAKROLIDI I LINKOZAMIDI		
J01FA01	eritromicin	sirup	R;SZ 125mg/5ml; 200mg/5ml; 250mg/5ml
		tablete	R;SZ 250mg; 500mg
		kapsule	R;SZ 250mg; 500mg
J01FA09	klaritromicin	sirup	R;SZ 125mg/5ml; 250mg/5ml
		tablete	R;SZ 250mg; 500mg
indikacije:	1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41; J42. 2. infekcije kože i mekog tkiva MKB: L00 - L08. 3. infekcije srednjeg uha: MKB: H65, H64. 4. infekcija želuca i dvanaestopala čnog crijeva sa Helicobacter pylori MKB: K29		
J01FA10	azitromicin	sirup	R;SZ 100mg/5ml; 200mg/5ml
		prašak za infuzije	SZ 500mg
		tablete	R;SZ 250mg; 500mg
		kapsule	R;SZ 250mg
indikacije:	1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J 40; J41; J42 2. infekcije kože i mekog tkiva MKB: L00 - L08 3. infekcije srednjeg uha: MKB: H65; H66 4. infekcije izazvane Chlamydia-ma MKB: A55; A56 5. negonokokni uretritis MKB: N34.1 6. cervicitis MKB: N72		
J01FF01 #	Klindamicin	kapsule, tablete	R;SZ 300 mg; 600mg
		injekcije	SZ 900mg/6ml; 300mg/2ml; 150mg/1ml;
indikacije:	obavezan antibiogram		

J01G	AMINOGLIKOZIDI		
J01GA01	streptomycin	prašak za injekcije	Z;SZ 1g
J01GB01	tobramicin	rastvor za inhalaciju	SZK 300mg/4ml
indikacije:	za liječenje oboljelih od cistične fibroze, MKB: E84, sa srednje teškom do teškom plućnom bolešću i dokazanom kolonizacijom Pseudomonas aeruginosa po predlogu Konzilijuma pedijatar – pulmologa Kliničkog centra Crne Gore		
J01GB03	gentamicin	injekcije	Z;SZ 20mg/2ml; 40mg/2ml; 80mg/2ml;120mg/2ml
J01GB06#	amikacin	injekcije	Z;SZ 100mg/2ml; 500mg/2ml
indikacije za Z:	nakon bolničkog liječenja, kao nastavak terapije obavezan antibiogram		
J01M	HINOLONI		
J01MA01#	ofloksacin	tablete	RS;SZ 200mg
	obavezan antibiogram		
J01MA02#	ciprofloksacin	tablete	RS;SZ 250mg; 500mg
indikacije:	1. zarazne bolesti crijeva Typhus abdominalis i Paratyphus MKB: A01, Salmonellosis MKB: A02, Shigellosis MKB: A03 2. infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis MKB: A15 - A19 3. polne infekcije izazvane Chlamydia uzročnikom MKB: A56 4. infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae MKB: J15.7 5. infekcije respiratornog trakta izazvane Chlamydia uzročnikom MKB: J16.0 6. infekcije urogenitalnog trakta MKB: N30; N34; N36; N37; N39; N41.1; N72 7. zapaljenje srednjeg uha MKB: H66 8. osteomyelitis MKB: M86 obavezan antibiogram	infuzije	SZ 100mg; 200mg
J01MA14	moksifloksacin	tablete	RS;SZ 400 mg
indikacije:	1. za liječenje teških oblika upale pluća; 2. za liječenje komplikovanih infekcija kože i mekih tkiva u jedinicama intenzivne njege	rastvor za infuziju	SZ 400mg/250ml
J01MB04	pipemidna kiselina	kapsule	R;SZ 200mg
J01X	OSTALI ANTIBIOTICI		
J01XA01#	vankomicin	kapsule	SZ 125mg; 250mg
	obavezan antibiogram	prašak za infuzije	SZ 500mg; 1000mg
J01XA02 #	teikoplanin	prašak za injekcije	SZ 200mg; 400mg
	obavezan antibiogram		
J01XD01	metronidazol	infuzije	SZ 500mg/100ml
		tablete	R;SZ 250mg; 400mg
J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU		
J02AC	DERIVATI TRAZOLA		
J02AB02	ketokonazol	tablete	R;SZ 200mg
J02AC03	vorikonazol	tablete	200mg
indikacije:	za sistemske gljivične infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata rezistentnih na terapiju flukonazolom po predlogu konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore primjena isključivo na tercijarnom nivou	prašak za rastvor za infuzije	SZK 200mg
J02AC01	flukonazol	infuzije	SZ 200mg/100ml
		kapsule	RS;SZ 50mg; 150mg
J02AC02	itrakonazol	kapsule	RS;SZ 100mg
J04	ANTITUBERKULOTICI		
J04A	LJEKOVI ZA TERAPIJU TUBERKULOZE		
J04AA01	para-amino salicilna kiselina	tablete	RS;SZ

J04AB01 indikacije:	cikloserin TBC rezistentna na antituberkulotike izbora: MKB-A15.0 po predlogu Konzilijuma pulmologa Specijalne bolnice za plućne bolesti-Brezovik ili po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	250mg
J04AB02	rifampicin	kapsule	RS;SZ	150mg; 300mg
J04AB30 indikacije:	kapreomicin TBC rezistentna na antituberkulotike izbora Po predlogu Konzilijuma pulmologa Specijalne bolnice za plućne bolesti- Brezovik ili po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	ampule	SZK	1g
J04AD03 indikacije:	etionamid TBC rezistentna na antituberkulotike izbora: MKB-A15.0 po predlogu Konzilijuma pulmologa Specijalne bolnice za plućne bolesti- Brezovik ili po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	250mg
J04AC01	izoniazid	tablete	RS;SZ	50mg; 100mg
J04AC51	izoniazid +piridoksin	kapsule	RS;SZ	400 mg +25 mg
J04AK01	pirazinamid	tablete	RS;SZ	500mg
J04AK02	etambutol	tablete	RS;SZ	100mg; 400mg
J05	ANTIVIRUSNI LJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
J05A	LJEKOVI SA DIREKTNIM DJELOVANJEM NA VIRUSE			
J05AB01	aciclovir	prašak za infuzije	SZ	250mg
		tablete	R, SZ	200mg
J05AB04	ribavirin	tablete	RK;SZK	200mg
	po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	kapsule	RK;SZK	200mg
J05AB06	ganciklovir po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	prašak za injekcije	SZK	500mg
J05AE01 indikacije:	sakvinavir HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	500mg
J05AE02 indikacije:	indinavir HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	kapsule	RK;SZK	200mg; 400mg
J05AE03 indikacije:	ritonavir HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	kapsule	RK;SZK	100mg
J05AE06 indikacije:	lopinavir, ritonavir HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	kapsule	RK;SZK	(200mg+50mg)
J05AF01 indikacije:	zidovudin HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	kapsule	RK;SZK	100mg; 250mg
J05AF02 indikacije:	didanozin HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 Po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	kapsule	RK;SZK	250mg; 400mg
J05AF04 indikacije:	stavudin HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	kapsule	RK;SZK	30mg; 40mg
J05AF05 indikacije:	lamivudin za tablete od 100mg 1. subakutni hepatitis B (6 mjeseci); MKB-B16.1 2. hronični hepatitis B; MKB-B18.0 3. hronični hepatitis C kada je kontraindikovana upotreba interferona alfa 2a; MKB-B18.2 za tablete od 150mg HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	100mg; 150mg

J05AF06 indikacije:	abakavir HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	300mg
J05AF30 indikacije:	abakavir, lamivudin, zidovudin HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	(300mg + 150mg + 300mg)
J05AG03 indikacije:	efavirenz HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	600mg;
		kapsule	RK;SZK	50mg; 100mg; 200mg;
J05AR01 indikacije:	lamivudin, zidovudin HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	(150mg + 300mg)
J05AR02 indikacije:	abakavir + lamivudin HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 Po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	(600mg + 300 mg)
J05AR03 indikacije:	tenofovir + emtricitabin HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24 po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	(245 mg+200mg)
J05AX08 indikacije:	raltegravir za liječenje oboljelih od HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24, koji su rezistentni ili razvijaju nus pojave na standardnu antivirusnu terapiju po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RK;SZK	400 mg
J06	SERUMI I IMUNOGLOBULINI			
J06A	IMUNOSERUMI			
J06AA01	antitoksin protiv difterije	injekcije	SZ	10 000 i.j.; 20 000 i.j.
J06AA02	antitoksin protiv tetanusa	injekcije	Z;SZ	1500 i.j.; 5000 i.j.
J06AA03	antitoksin protiv zmijskog otrova	injekcije	Z;SZ	5ml
J06AA04	antitoksin protiv botulinuma"	injekcije	SZ	
J06AA05	anti toksin protiv gasne gangrene"	injekcije	SZ	
J06AA06	serum protiv bjesnila"	injekcije	Z;SZ	
J06B	IMUNOGLOBULINI			
J06BA01	imunoglobulin - IgG humani	injekcije	SZ	(16%) 2ml; 5ml
J06BA02	imunoglobulin - IgIV 7S	koncetrat za inf.	SZ	(5%,10%); 10ml; 20ml; 50ml; 100ml
J06BB01	anti D (Rho) imunoglobulin	injekcije	Z;SZ	50mcg;100mcg;200mcg;250mcg;300mcg
J06BB02	imunoglobulin antitetanusni	injekcije	Z;SZ	250ij/ml; 500i.j.
J06BB04	hiperimunoglobulin protiv hepatitisa "B"	prašak za injekcije	Z;SZ	10mcg
J06BB05	imunoglobulin protiv bjesnila	injekcije	Z;SZ	1ml; 2ml; 5ml; 10ml (sa najmanje 150ij/ml)
J07	VAKCINE			
J07A	BAKTERIJSKE VAKCINE			
J07AE01 indikacija:	vakcina protiv kolere vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	ampule	Z;SZ	10ml
J07AG01	vakcina protiv hemofilusa influence tip B, prečiš ćena i konjugovana	prašak za injekcije	Z;SZ	10mcg
J07AH03 indikacija:	vakcina protiv meningokoknog meningitisa grupa A i C , prečišćena polisaharidna vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	prašak za injekcije	Z;SZ	50mcg+50mcg
J07AH04 indikacija:	vakcina protiv meningokoknog meningitisa četvorovalentna (A+C+W135+Y), prečiš ćena polisaharidna vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	prašak za injekcije	Z;SZ	0,5 ml

J07AJ01	vakcina protiv velikog kašlja	ampule	Z;SZ	5ml
J07AJ51	vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja - cijelo ćelijska	ampule	Z;SZ	0,5 ml
J07AJ52	vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (Di Te PerAl), acelularna	ampule	Z;SZ	0,5ml; 5ml; 10ml
J07AL01 indikacija:	vakcina protiv pneumokoka, polisaharidna vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	injekcije	Z;SZ	0,5 ml
J07AL02 indikacija:	vakcina protiv pneumokoka, konjugovana vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	ampule	Z;SZ	0,5 ml
J07AM01	vakcina protiv tetanusa	ampule	Z;SZ	5Lf/0,5ml; 10Lf/10ml
J07AM51	vakcina protiv tetanusa i difterije(Di Te Al)	ampule	Z;SZ	5ml; 10ml
J07AN01	vakcina protiv tuberkuloze, živa atenuirana	ampule	Z;SZ	1ml; 2ml; 5ml
J07AP03 indikacija:	vakcina protiv trbušnog tifusa, prečišćena polisaharidna vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	ampule	Z;SZ	0,5ml; 10ml
J07B	VIRUSNE VAKCINE			
J07BA01 indikacija:	vakcina protiv krpeljnog meningoencefalitisa, inaktivisna cjerovirusna vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	ampule	Z;SZ	0,5ml
J07BB01 indikacija:	vakcina protiv gripa - inaktivisana, cjeloćelijska vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	ampule	Z;SZ	0,5ml; 5ml
J07BB02 indikacija:	vakcina protiv gripa, inaktivisana, rascijepljena i prečišćena ("split") ili pojedinačna ("subunit") vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	ampule	Z;SZ	0,5 ml
J07BC01	vakcina protiv žutice izazvane virusom hepatitisa B, rekombinantna	ampule	Z;SZ	0,5ml; 1ml; 10mcg; 20mcg
J07BC02	vakcina protiv žutice izazvane virusom hepatitisa A, inaktivisana cjelovirusna	ampule	Z;SZ	0,5 ml
J07BD01	vakcina protiv malih boginja, živa atenuirana	ampule	Z;SZ	0,5ml
J07BD52	vakcina protiv morbila, rubeole i parotitisa, živa atenuirana	prašak za injekcije		0,5 ml
J07BF02	vakcina protiv dječije paralize - živa, oralna, tritipna	ampule	Z;SZ	1ml; 2ml; 5ml
J07BF03	vakcina protiv dječije paralize, inaktivisana, tritipna	ampule		0,5 ml
J07BG01 indikacija:	vakcina protiv bjesnila, inaktivisana vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	ampule	Z;SZ	(2,5 i.j./ml) 0,5ml; 1ml; 5ml
J07BL01 indikacija:	vakcina protiv žute groznice, živa atenuirana vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti	prašak za injekcije	Z;SZ	0,5ml
J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, acelularna komponenta pertusisa, inaktivirana vakcina protiv dječije paralize i vakcina protiv hemofilusa influence tip b, kombinovana	lio bočica sa rastvaračem u špricu	Z;SZ	0,5 ml

L	ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI		
L01	ANTINEOPLASTICI		
L01A	ALKILIRAJUĆI CITOSTATICI		
L01AA01	ciklofosamid	tablete	RS;SZ 50mg
		prašak za injekcije	SZ 200 mg; 500mg; 1000mg
	Po predlogu specijaliste onkologa, specijaliste reumatologa i specijaliste hematologa		
L01AA02	hlorambucil po predlogu specijaliste hematologa	tablete	RS;SZ 2mg
L01AA03	melfalan po predlogu specijaliste hematologa	tablete	RS;SZ 2mg; 5mg
L01AA06 indikacije:	ifosfamid 1. sarkom kostiju i mekih tkiva 2. testikularni karcinom (treća linija) 3. agresivni limfom (ICE protokol) po predlogu specijaliste onkologa, specijaliste hematologa	ampule	SZ 500mg; 1000mg
L01AB01	busulfan po predlogu specijaliste hematologa	tablete	RS;SZ 2mg
L01AX03 indikacije:	temozolomid za terapiju novodijagnostifikovanog glioblastoma multiforme u prvoj liniji liječenja, zajedno sa zračnom terapijom, MKB: C71 nastavak liječenja indikovano samo kod povoljnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest) po predlogu konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju	kapsule	RS;SZ 5mg; 20mg; 100mg; 250mg; 140mg; 180mg
L01AX04	dakarbazin po predlogu specijaliste onkologa, specijaliste reumatologa i specijaliste hematologa	prašak za injekcije	SZ 100mg; 200mg
L01B	ANTIMETABOLITI		
L01BA01 indikacije:	metotreksat za šifre MKB: od C00 - C97, M05 i L40 po predlogu specijaliste onkologa, specijaliste reumatologa i specijaliste hematologa	tablete	RS;SZ 2,5mg; 5mg
		ampule	Z;SZ 50mg/5ml, 10mg/1ml, 500mg/20ml, 1000mg/20ml
		rastvor za injekcije	Z;SZ 10mg/ml; 15mg/1,5ml; 20mg/2ml; 25mg/2,5ml
L01BA04 indikacije:	pemetreksed uznapredovali neresektabilni mezoteliom pleure odobrava se primjena dva ciklusa nakon čega je potrebna evaluacija tumorskog odgovora. Nastavak liječenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog (kompletna ili djelimična remisija, stabilna bolest) do ukupno šest ciklusa liječenja. po predlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju, Konzilijuma specijalne bolnice Brezovik	prašak za infuziju	SZK 500mg
L01BB02	merkaptopurin po predlogu specijaliste hematologa	tablete	RS;SZ 50mg
L01BB03	tiogvanin po predlogu specijaliste hematologa	tablete	RS;SZ 40mg
L01BB04 indikacije:	kladribin leukemija vlasastih ćelija po predlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore	injekcije	SZK 10mg/5ml
L01BB05 indikacije:	1. maligni limfomi; MKB-C81.0; C82.0; C83.0; C84.0; C85.0 2. hronična limfocitna leukemija; MKB-C91.1 rezistentni na prvu liniju terapije po predlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore	tablete	RS;SZ 10mg
		prašak za injekcije	SZ 50mg

L01BC01	citarabin	prašak za injekcije	SZ	100mg; 500mg; 1000mg; 2000mg
L01BC02	fluorouracil	injekcije	SZ	250mg/5ml; 500mg/10ml
L01BC05 indikacije:	gemcitabin 1. prva linija metastatskog ili uznapredovalog adenokarcinoma pankreasa, 2. metastatski nemikrocelularni karcinom pluća, 3. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom mokraćne bežike, 4. metastatski karcinom dojke nakon antraciklina i taksana ili u kombinaciji sa njima liječenje gemcitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriterijumi: opšte stanje ECOG 0-1, nepostojanje metastaza u CNS-u i/ili kostima; vrijednost bilirubina <1.5x gornja granica uredne vrijednosti; AST, ALT, GGT <2x gornja granica urednih vrijednosti; kreatinin <1.5x gornja granica urednih vrijednosti; vrijednost neutrofila >1,5x10 ³ /mm ³ ; vrijednost trombocita >10x10 ³ /mm ³ odobrava se primjena tri ciklusa liječenja, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija. U slučaju pozitivnog odgovora (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest) može se nastaviti sa daljom terapijom. Potrebno je da pacijent ima PS od 0 do 1 i da ima zadovoljavajuće hematološke parametre za primjenu, da nema sekundarne depozite u CNS-u po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore za indikacije pod 1, 2, 3, 4, i Konzilijuma Specijalne bolnice Brezovik za indikaciju pod tačkom 2.	prašak za infuzije	SZ	200mg; 1000mg
L01BC06 indikacije:	kapecitabin 1. metastatski karcinom dojke nakon antraciklina i taxana; MKB-C50 2. rani i metastatski kolorektalni karcinom; MKB-C18; C19; C20; C21 postoperativna terapija u slučaju kliničkog stadijuma Dukes C, u slučaju komorbiditeta koji ne dozvoljava primjenu standardne adjuvantne terapije, sa PS od 0 do 1. odobrava se terapija na period od tri mjeseca, nakon čega je specijalista interne medicine - onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu sa ciljem provjere stepena tumorskog odgovora. nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest). po predlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju	tablete	RS;SZ	150mg;500mg
L01C	PODOFILINSKI DERIVATI I BILJNI ALKALOIDI			
L01CA01	vinblastin	prašak za injekcije	SZ	10mg
L01CA02	vinkristin	injekcije	SZ	1mg; 2mg
L01CB01	etopozid	kapsule	RS;SZ	50mg
		koncentrat za infuziju	SZ	100mg/5ml
	po predlogu specijaliste hematologa, specijaliste onkologa i specijaliste pulmologa - onkologa			
L01CD01 indikacije:	paklitaksel 1. prva ili druga linija hemioterapije metastatskog karcinoma dojke; 2. primjena postoperativno kod ranog karcinoma dojke nakon 4 ciklusa AC protokola ukoliko postoje pozitivni limfni čvorovi aksile i ako tumor nije hormonski zavistan; 3. prva ili druga linija hemioterapije karcinoma jajnika u protokolu sa cisplatinom ili karboplatinom; 4. prva ili druga linija hemioterapije uznapredovalog ili metastatskog nemikroćelijskog karcinoma pluća; prije liječenja neophodno je da su ispunjeni uslovi: da performans status bude od 0 do 2, da nema metastaza na mozgu, da su biohemijski parametri u sljedećim granicama bilirubin do 1,5 puta uvećan, transaminaze do 5 puta od normalnih vrijednosti, dok je nivo neutrofila neophodno da bude veći od 1,5 x 10 ⁹ mm ³ , dok broj trombocita da bude veći od 100 x 10 ³ mm ³ . Nakon tri ciklusa potrebna je kompletna evaluacija. Terapija se nastavlja samo u slučaju pozitivnog odgovora. po predlogu specijaliste onkologa za indikacije pod 1,2,3,4, i specijaliste pulmologa - onkologa za indikaciju pod tačkom 4.	koncentrat za infuziju	SZ	30mg/5ml; 100mg/16,7ml

L01CD02	docetaksel	koncentrat za infuziju	SZ	20mg/0,5ml; 20mg/1ml; 80mg/2ml;80mg/4ml
indikacije:	1. hemioterapija metastatskog karcinoma dojke; 2. hormonski refrakterni metastatski karcinom prostate; 3. rani karcinom dojke sa pozitivnim limfnim čvorovima aksile u sekvenciranim ili konkomitantnim protokolima hemioterapije; 4. druga linija metastatskog nemikro ćelijskog karcinoma pluća; prije liječenja neophodno je da su ispunjeni uslovi - da performans status bude od 0 do 2, da nema metastaza na mozgu, da su biohemijski parametri u sledećim granicama bilirubin do 1,5 puta uvećan, transaminaze do 5 puta od normalnih vrijednosti, dok je nivo neutrofila neophodno da bude veći od $1,5 \times 10^9 \text{ mm}^3$, a broj trombocita da bude veći od $100 \times 10^9 \text{ mm}^3$. nakon tri ciklusa potrebna je kompletna evaluacija. Terapija se nastavlja samo u slučaju pozitivnog odgovora. po predlogu specijaliste onkologa za indikacije pod 1,2,3,4, i specijaliste pulmologa - onkologa za indikaciju pod tačkom 4			
L01D	CITOSTATSKI ANTIBIOTICI			
L01DB01	doksorubicin	injekcije	SZ	10mg; 50mg
L01DB02	daunorubicin	prašak za infuzije	SZ	20mg
indikacije:	za šifre MKB: C91; C92			
L01DB03	epirubicin	injekcije	SZ	10mg; 50mg
L01DB06	idarubicin	kapsule	RS;SZ	5mg; 10mg
		prašak za infuzije	SZ	5mg; 10mg
L01DB07	mitoksantron	koncentrat za infuziju	SZ	10mg/5ml; 20mg/10ml; 30mg/15ml
indikacije:	1. akutna mijeloblastna i akutna limfoblastna leukemija, agresivni NHL, PS 0 ili 1 2. maligne primarne progresivne forme multiple skleroze			
L01DC01	bleomicin	ampule	SZ	15mg
	po predlogu odgovarajućeg Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore			
L01X	OSTALI CITOSTATICI			
L01XA01	cisplatin	koncentrat za infuzije	SZ	10mg; 50mg;
L01XA02	karboplatin	koncentrat za infuzije	SZ	50mg/5ml; 150mg/15ml; 450mg/45ml
L01XA03	oksaliplatin	prašak za infuzije	SZ	50mg; 100mg
indikacije:	metastatski karcinom kolorektuma i postoperativno u kombinaciji sa 5FU/LV, ukoliko postoje zahvaćeni limfni čvorovi - Dukes C u slučaju PS od 0 do 1 na tri meseca, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija i procena tumorskog odgovora na terapiju. Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest)			
L01XB01	prokarbazin	kapsule	RS;SZ	50mg
	po predlogu specijaliste hematologa			
L01XC02	rituksimab	koncentrat za infuziju	SZK	100mg/10ml; 500mg/50ml
indikacije:	1. sastavni dio liječenja primarne hemoterapije (CHOP) ili "CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih - B - Non-Hodgkin - limfoma (DLCL:tzv."Diffuze large B-cell lymphoma"), PS 0 ili 1 2. non-Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, Kliničkog stadijuma III i IV 3. reumatoidni artritis-rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovani je kao četvrta linija za liječenje odraslih bolesnika sa teškim aktivnim reumatoidnim artilisom koji ili nijesu adekvatno oreagovali ili nijesu uopšte podnosili terapiju: a) nesteroidnim antireumaticima (NSAID) b) lijekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD) c) lijekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze (anti TNF 9 u trajanju od 6 mjeseci) po predlogu Konzilijuma hematologa (za indikacije pod 1. i 2.) i reumatologa (za indikacije pod 3.) Kliničkog centra CG			

L01XC03 indikacije:	trastuzumab 1. rani karcinom dojke - HER 2 +++, nastavak adjuvantne terapije (hiruški tretman, adjuvantna hemioterapija) nakon hemioterapije sa antraciklinima , tokom maksimalno jedne godine. Terapija je moguća ukoliko je PS od 0 do 1, EFLV veća od 50 % uz uredne laboratorijske parametre (kompletna krvna slika i hepatogram) 2. metastatski karcinom dojke - HER 2 +++, PS 0 ili 1, prva linija terapije nakon antraciklina (adjuvantno) uz paclitaxel ili docetaxel. Neophodan je ECOG 0-1, nepostojanje metastaza na CNS - u, bez opsežnih metastaza na plućima koje izazivaju značajnu simptomatologiju, uz adekvatne hematološke i biohemijske parametre. Nakon tri ciklusa primjene liječenja potrebna je kompletna evaluacija i procjena tumorskog odgovora nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest). po predlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju	lio. bočice SZK 440mg;600mg
L01XC06 indikacije:	cetuximab 1. metastatski kolorektalni kancer sa nemutiranim tipom KRAS nakon progresije na prethodno primijenjenu hemioterapiju; 2. uznapredovali ili inoperabilni planocelularni karcinom glave i vrata zajedno sa zračnom terapijom, sa PS od 0 do 1, te kod pacijenta kod kojih je kontraindикована terapija sa platinskim derivatima. neophodno je da pacijent ima PS od 0 do 1, da nema metastaze na CNS - u, da ima adekvatne vrijednosti biohemijskih parametara koje garantuju sigurnu primjenu lijeka, da su hematološki parametri adekvatni (granulociti preko 1,5 tromBočiti preko 100). po predlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju	rastvor za infuziju SZK 20ml (5mg/ml)
L01XC07 indikacije	bevacizumab 1. metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa hemioterapijom, ukoliko je pacijent sa PS ECOG 0-1 , očekivano preživljavanje duže od godinu dana, nema metastaze u mozgu, da je vrijeme od hirurške intervencije duže od 6 nedelja, da su vrijednosti bilirubina povišene manje od 2 puta, da su vrijednosti transaminaza manje od 5 puta povišene, dok je vrijednost kreatinina u serumu do 1,5 puta od gornje normalne vrijednosti. Takodje je neophodno da su vrijednosti krvne slike odgovarajuće Terapija se odobrava na dva meseca, nakon čega je neophodno uraditi kompletnu evaluaciju. Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest). Po predlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore 2. uznapredovali epitelijalni Ca jajnika, jajovoda ili primarni peritonealni Ca u kombinaciji sa karboplatinom i paklitakselom Po predlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore 3. nereksetabilni, uznapredovali, metastatski ili recidivirajući nesitnoćelijski Ca pluća Po predlogu Konzilijuma Specijalne bolnice Brezovik i Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju.	koncentrat za infuziju SZK 400mg/16ml; 100mg/4ml

L01XE01 indikacije:	imatinib 1.hronična mijeloidna leukemija sa dokazanim Philadelphia hromozomom (PhH) Nastavak terapije se odobrava, ukoliko je smanjenje vrednosti PhH za 50 %; za period od 6 mjeseci liječenja; MKB-C92.1 Po predlogu Konzilijuma specijalista hematologa 2. inoperabilni i metastatski GIST kod bolesnika sa PS od 0 do 1 (do 6 mjeseci); MKB-C76.2 3. postoperativna primjena kod GIST-a, ukoliko postoje kriterijumi visokih faktora relapsa - ukoliko je tumor veći od 5 cm, postojanje mitoze preko 6-10/50 HPF, ukoliko je primarni tumor van želuca, postojanje rupture GIST-a (do najduže godinu dana). Po predlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju za indikacije pod 2 i 3	kapsule	RK;SZK	50mg; 100mg
L01XE03 indikacije:	erlotinib nemikročelijski karcinomi pluća, koji su prethodno liječeni hemioterapijom - indikuju se 2 ciklusa terapije, ukoliko se verifikuje pozitivan tumorski odgovor u vidu CR, PR, SD, može se još odobriti do 7 ciklusa terapije. Za započinjanje liječenja potrebni su kriterijumi ECOG 0 do 1, nepostojanje metastaza u CNS - u. Nivo bilirubina je potrebno da je do 1,5 puta povišen, dok transaminaze do maksimalno 3 puta povišenja u odnosu na normalne vrednosti. Takodje su neophodne adekvatne vrijednosti granulocita i trombocita za primjenu hemioterapije. Kriterijumi za isključivanje terapije: de-novo razvijeni akutni pulmonalni sindrom neobjašnjive etiologije (dispnea, kašalj i groznica), nerazvijen osip u toku prvih 4-8 nedjelja od započinjanja terapije i progresije bolesti. Po predlogu Konzilijuma Specijalne bolnice Brezovik i Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju.	tablete	RK;SZK	25mg;100mg;150mg
L01XE04 indikacije:	sunitinib metastatski karcinom bubrega, monoterapija u prvoj liniji liječenja. Odobravaju se dva ciklusa nakon čega je potrebna kompletna evaluacija tumorskog odgovora. Neophodno je da pacijent ima ECOG od 0 do 1, da nema metastaze na mozgu, da ima adekvatne biohemijske parametre Terapija se odobrava na dva meseca, nakon čega je neophodno uraditi kompletnu evaluaciju. Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest). Po predlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju.	kapsula tvrda	RK;SZK	12,5mg; 25mg; 50mg
L01XX02	I - asparaginaza"	ampule	SZ	
L01XX05 indikacije:	hidroksikarbamid Hronične mijeloproliferativne bolesti: - hronična granulocitna leukemija MKB: C92.1 - esencijalna trombocitemija MKB: D47.3 - primarna mijelofibroza MKB: C94.5 - prava policitemija MKB: D45 Po predlogu specijaliste hematologa	kapsule	RS;SZ	500mg
L01XX11 indikacije:	estramustin Za šifru MKB: C 61, karcinom prostate, hormono refrakteran PS 0 ili 1 Po predlogu specijaliste urologa, specijaliste onkologa	kapsule	RS;SZ	140mg
L01XX14 indikacije:	tretionin akutna promijelocitna leukemija - C92.4 Po predlogu specijaliste hematologa	kapsule	RS;SZ	10mg

L01XX19	irinotekan	koncentrat za infuziju	SZ	40mg/2ml; 100mg/5ml
indikacije:	prva linija hemioterapije metastatskog karcinom kolona ili rektuma, uz 5FU i LV, ili nakon progresije na prethodne hemioterapijske agense. Neophodan je adekvatan performans status, da pacijent nema metastaze na mozgu, da su hematološki i bio hemijski parametri adekvatni za primjenu hemioterapije (nivo bilirubina manji od 1,5 puta gornja granica normalne vrijednosti; nivo AST i ALT manji od 5 puta gornja granica normalne vrijednosti; nivo kreatinina manji od 1,25 puta gornja granica normalne vrijednosti; nivo granulocita veći od $1,5 \times 10^3/\text{mm}^3$; nivo trombocita veći od $100\,000/\text{mm}^3$) Po predlogu specijaliste onkologa			
L01XX23	mitotan	tablete	RS,SZ	500mg
indikacije:	inoperabilni i metastatski adrenokortikalni karcinom; MKB-C74.0 Po predlogu Konzilijuma za endokrine tumore. Terapija se odobrava na tri mjeseca nakon čega je neophodno uraditi kompletnu evaluaciju. U slučaju pozitivnog tumorskog odgovora, dozvoljen je nastavak terapije.			
L02	ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA			
L02A	HORMONI I SODNI LJEKOVI			
L02AE03	goserelin	implantat	SZ	3,6mg; 10,8mg
indikacije:	1. karcinom prostate 2. karcinom dojke 3. endometrioza Po predlogu Konzilijuma onkologa, urologa i ginekologa Kliničkog centra Crne Gore			
L02AE04	triptorelin	prašak za injekcije	SZ	0,1mg; 3,75mg; 11.25mg
indikacije:	1. palijativni tretman uznapredovalog karcinoma prostate Po predlogu Konzilijuma urologa Kliničkog centra Crne Gore 2. preuranjeni pubertet Po predlogu Konzilijuma dječijih endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore 3. fibromiom uterusa prije operacije 4. endometrioza Za indikacije 3. i 4. po predlogu Konzilijuma ginekologa Kliničkog centra Crne Gore			
L02B	ANTAGONISTI HORMONA			
L02BA01	tamoksifen	tablete	RS,SZ	10mg; 20mg
indikacije:	1. metastatski hormonski zavistan karcinom dojke, do trajanja pozitivnog odgovora na terapiju (CR, PR, SD); MKB - C50 2. rani hormon zavistan karcinom dojke do 5 godina; MKB - C50 Po predlogu specijaliste onkologa			
L02BB	ANTI - ANDROGENI			
L02BB03	bikalutamid	tablete	RS,SZ	50mg; 150mg
indikacije:	1. za dozu od 50mg dnevno: uznapredovali, metastatski karcinom prostate, u kombinaciji sa LHRH analogom ili orhidektomijom u kompletnoj androgenoj blokadi; MKB-C61 2. za dozu od 150 mg dnevno: umjesto kastracije kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene metastaze, koštane ili visceralne). Po predlogu specijaliste onkologa-urologa			
L02BG	INHIBITORI ENZIMA			
L02BG03	anastrozol	tablete	RS,SZ	1mg
indikacije:	1. kod postmenopausalnih žena sa metastatskim kancerom dojke i kao adjuvantna terapija hormonski zavisnog kancera dojke kod postmenopausalnih žena 2. kod pacijentkinja u drugoj liniji terapije metastatskog hormonozavisnog karcinoma dojke koji je progredirao na tamoksifen Odobrava se terapija od tri meseca, nakon kojih se radi evaluacija, a nastavak liječenja se odobrava u slučaju adekvatnog tumorskog odgovora CR, PR, SD Potrebno je da je tumor hormonski zavistan, da je ECOG od 0 do 3 i da pacijentkinja nema metastaze u CNS - u Po predlogu specijalista onkologa.			

L02BG04 indikacije:	letrozol 1. kod postmenopauzalnih žena sa metastatskim kancerom dojke i kao adjuvantna terapija hormonskim receptorima 2. kod pacijentkinja u drugoj liniji terapije metastatskog hormonzavisnog karcinoma dojke koji je progredirao na tamoxifen. Odobrava se terapija od tri meseca nakon kojih se radi evaluacija, nastavak lečenja se odobrava u slučaju adekvatnog tumorskog odgovora CR, PR, SDP potrebno je da je tumor hormonski zavistan, da je ECOG od 0 do 3 I da pacijentkinja nema metastaze u CNS-u. Po predlogu specijaliste onkologa.	tablete	RS;SZ	2,5mg
L03	IMUNOSTIMULATORI			
L03A	CITOKINI I IMUNOMODULATORI			
L03AA02	filgrastim	injekcije	SZ	30 mij; 48 mij
L03AA02	filgrastim - biološki sličan lijek Po predlogu lekara specijaliste za: - pacijente kojima se prvi put uvodi biološka terapija - pacijente koji se prevode na terapiju biološki sličnim lijekom	injekcije	SZ	30 mij; 48 mij
L03AB04 indikacije:	interferon alfa 2a 1. hronični hepatitis B: a) serološki profil : Wild type (HBeAg poz., HBV DNA poz.) Precore Mutante (HBV DNA poz.) b) virusna replikacija > 6mjeseci c) stalno povišen ALT > 2x d) histološki dokazano hronično zapaljenje e) viremija nije > 200pg/ml 2. hronični hepatitis C: a) serološki profil - anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan b) prisutna virusna replikacija >6mjeseci c) stalno povišen ALT>2x d) histološki dokazano hronično zapaljenje 3. kapoši sarkom kod AIDS - a 4. triholeukemija 5. održavanje remisije multiplog mijeloma 6. karcinom renalnih ćelija 7. maligni melanom 8. pojedini oblici non-Hodgkin limfoma i osteomielfibrosoma 9. esencijalna tromboцитopenija u trudnoći 10. hronična granulocitna leukemija Po predlogu Konzilijuma hematologa ili onkologa Kliničkog centra Crne Gore. Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou	injekcije	Z	3 Mij; 4,5Mij; 6 Mij; 9Mij; 18Mij
L03AB07 indikacije:	interferon beta 1a 1. multipla skleroza: a) početak bolesti u periodu do 50 godine b) EDSS 4 i manje c) najmanje dva relapsa u dvije godine uključivanja u tretman d) definitivna dijagnoza relapsno-remitentne multiple skleroze e) odsustvo trudnoće f) odsustvo psihičkih poremećaja Upotreba lijeka se odobrava na zahtjev Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore Kriterijumi za prekid terapije: 1) progresija praćena relapsom za 1 EDSS u toku 12 mjeseci 2) progresija bez relapsa za 1 EDSS u toku 6 mjeseci 3) tri relapsa vezana za MS u toku 12 mjeseci 4) teška depresija 5) trudnoća 6) alergija na interferon ili humani albumin Po predlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou	injekcije	SZK	22mcg(6 mil i.j.)/0,5 ml; 44mcg(12 mil i.j.)/0,5ml; 30mcg (6 mil.i.j.)/0,5ml

L03AB08 indikacije:	interferon beta 1b 1. multipla skleroza: a) početak bolesti u periodu do 50 godine b) EDSS 4 i manje c) najmanje dva relapsa u dvije godine uključivanja u tretman d) definitivna Dg relapsno-remitentne multiple skleroze e) odsustvo trudnoće f) odsustvo psihičkih poremećaja Upotreba lijeka se odobrava na zahtjev Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore Kriterijumi za prekid terapije: 1) progresija praćena relapsom za 1 EDSS u toku 12 mjeseci 2) progresija bez relapsa za 1 EDSS u toku 6 mjeseci 3) tri relapsa vezana za MS u toku 12 mjeseci 4) teška depresija 5) trudnoća 6) alergija na interferon ili humani albumin Po predlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou	prašak za injekcije	SZK	0,25mg (8Mij/1,2ml)
L03AB11 indikacije:	peginterferon alfa 2a 1. hronični hepatitis C: a) serološki profil - anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan; b) prisutna virusna replikacija >6 mjeseci; c) stalno povišen ALT>2x; d) histološki dokazano hronično zapaljenje jetre Po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore. Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou.	injekcije	SZK	135mcg/0,5ml; 180mcg/0,5ml
L03AX03 indikacije:	atenuirani bacili M. bovis-soj BCG primarni i recidivantni karcinom "in situ" mokraćne bešike Odobrava se terapija za period od šest mjeseci, a nakon toga urolog daje procjenu stepena odgovora na terapiju	lio bočica	SZ	
L04	IMUNOSUPRESIVI			
L04AA01	ciklosporin A	kapi	RS;SZ	100mg/ml
		kapsule	RS;SZ	25mg; 50mg; 100mg
		koncentrat za infuzije	SZ	250mg/5ml
L04AA01	ciklosporin A - generička paralela Po predlogu ljekara specijaliste za: - pacijente kojima se prvi put uvodi terapija - pacijente koji se prevode na terapiju generičkom paralelom	kapi	RS;SZ	100mg/ml
		kapsule	RS;SZ	25mg; 50mg; 100mg
L04AA05	takrolimus	kapsule, kapsule sa produženim oslobađanjem	RS;SZ	0,5mg; 1mg; 3mg; 5mg
L04AA05 indikacije:	takrolimus - generička paralela Po predlogu ljekara specijaliste za: - pacijente kojima se prvi put uvodi terapija - pacijente koji se prevode na terapiju generičkom paralelom	kapsule, kapsule sa produženim oslobađanjem	RS;SZ	0,5mg; 1mg; 3mg; 5mg
L04AA06	mikofenolna kiselina	tablete	RS;SZ	180mg; 360mg;500mg
		kapsule	RS;SZ	250mg
L04AA06	mikofenolna kiselina - generička paralela Po predlogu ljekara specijaliste za: - pacijente kojima se prvi put uvodi terapija - pacijente koji se prevode na terapiju generičkom paralelom	tablete	RS;SZ	180mg; 360mg;500mg
		kapsule	RS;SZ	250mg

L04AB01	Etanercept	prašak za injekcije SZK 25mg; 50mg
indikacije:	1. za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života 2. za liječenje reumatoidnog artritisa nakon neuspjeha na primjenu najmanje dva lijeka iz grupe lijekova koji modificiraju bolest (DMARDs) u punoj dozi i adekvatnom vremenu primjene od kojih jedan obavezno treba biti metotreksat u dozi do 20mg nedjeljno i kroz najmanje šest mjeseci liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriterijumi: a) aktivna bolest, ACR stadijum I-III:SE=28 (CRP=12), =6 otečenih, =6 bolnih zglobova b) funkcionalni skor izražen HAQom treba biti 1-2.5 c) indeks aktivnosti bolesti (DAS)=5.1 d) primjena treba biti evaluirana nakon 12 nedjelja odgovorom ACR 20 ili DASom=1.2 (ili postizanjem skora manjeg od 3.2) Ukoliko se ne postignu navedeni kriterijumi, terapiju treba prekinuti 3. za liječenje ankilozirajućeg spondilitisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseci liječenje je dozvoljeno ukoliko se ispunjeni kriterijumi: a) aktivna bolest=4 nedjelje prema BASDI indeksu i intenzitetom krstobolje=4 prema VAS b) prema procjeni subspecijalista reumatologa ukupna težina bolesti=4 prema skali 0-10, a koja progredira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/i ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca, progresija strukturnih promjena) c) Nakon najmanje 12 nedjelja primjene očekivani učinak: 50% BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje za 2 na 0-10 skali d) terapija se prekida kod izostanka očekivanog efekta ili razvoja nuspojava Po predlogu Konzilijuma reumatologa Kliničkog centra Crne Gore Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou	
L04AB02	infliksimab	injekcije SZK 100mg
indikacije:	1. liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti; 2. liječenje aktivne Crohnove bolesti koja je refrakterna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja kortikosteroida i imunomodulatora; 3. za liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa kod odraslih bolesnika koji nijesu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječenje kortikosteroidima i 6-merkaptopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu 4. za liječenje reumatoidnog artritisa nakon neuspjeha na primjenu najmanje dva lijeka iz grupe lijekova koji modifikuju bolest (DMARDs) u punoj dozi i adekvatnom vremenu primjene od kojih jedan obavezno treba biti metotreksat u dozi do 20 mg nedjeljno i kroz najmanje 6 mjeseci. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriterijumi: a) aktivna bolest ACR stadijuma I-IIISE>=28 (CRP>=12), >=6 otečenih, >=6 bolnih zglobova; b) funkcionalni skor izražen HAQom treba biti 1-2.5; c) indeks aktivnosti bolesti (DAS) >=5.1; d) primjena treba biti evaluirana nakon 12 nedjelja odgovorom ACR 20 ili DAS-om >=1.2 (ili postizanjem skora manjeg od 3.2) a ukoliko se ne postignu terapiju treba prekinuti; 5. za liječenje psorijatičnog artritisa nakon izostanka efekta ili kontraindikacija za najmanje 2 nesteroidna antireumatika (od kojih jedan mora biti indometacin) primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca i nakon izostanka efekta ili kontraindikacija najmanje 3	

	osnovna lijeka primijenjena u maksimalnoj dozi kroz 4 mjeseca, a od kojih jedan mora biti sulfalazin i/ili 2 pokušaja lokalne infiltracije glukokortikoida. Liječenje dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriterijumi: a) aktivna bolest ≥ 4 nedjelje ≥ 3 bolna i $\geq$ otečena zglobova; b) prema procjeni subspecialiste reumatologa ukupna težina bolesti ≥ 4 prema skali 0-10, a koja uzima u obzir aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjuterska tomografija, magnetna rezonanca, progresija strukturnih promjena); c) nakon najmanje 12 nedjelja primjene očekivani efekat 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecialista reumatologa (skala 0-10); d) terapija se prekida kod izostanka očekivanog efekta ili razvoja neželjenih dejstava; e) za psorijatični spondilitis primjenjuju se kriterijumi za ankilozirajući spondilitis; f) težina zglobne bolesti ocjenjuje se nezavisno o težini kožne bolesti. 6. Za liječenje aktivnog ankilozirajućeg spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa a. Nakon izostanka djelovanja ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi u toku 2 mjeseca primjene. b. Kod aktivne bolesti trajanja ≥ 4 nedjelje prema BASDAI indeksu ≥ 4. c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti ≥ 4 na skali 0-10, a koja uzima u obzir - aktivni koksitis, sinovitis/entezitis i/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca, progresija strukturnih promjena). d. Nakon najmanje 12 nedjelja primjene očekivani efekat je - 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za ≥ 2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog efekta ili razvoja neželjenih dejstava, a nastavlja kod postizanja zadatog efekta. Po predlogu Konzilijuma gastroenterologa Kliničkog centra Crne Gore za indikacije pod 1, 2 i 3, a za indikacije pod 4, 5 i 6 po predlogu Konzilijuma reumatologa Kliničkog centra Crne Gore.			
L04AC07 indikacije:	tocilizumab 1. liječenje visokoevolutivnog rezistentnog reumatoidnog artritisa u kombinaciji sa metotreksatom ili kao monoterapija za liječenje koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili prethodnu terapiju lijekovima koji bolesnika sa aktivnim reumatoidnim artritisom, koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili prethodnu terapiju lijekova koji modifikuju tok bolesti ili antagonistima faktora nekroze tumora (anti TNF) (aktivni RA definisan je kao DAS 28 (DAS 28 - disease activity score - ocjena aktivnosti bolesti na 28 zglobova) $\geq 5,1$ ili DAS 28 $\geq 3,2 + 6$ otečenih zglobova / od ukupno 44 na rukama i nogama). Efikasnost lijeka procjenjuje se 12 nedjelja nakon prve infuzije sa zahtjevom poboljšanja: a) ako je liječenje započeto s DAS 28 $\geq 5,1$ pad DAS 28 za $\geq 1,2$ u odnosu na početno stanje ili ukupno DAS 28 $\leq 3,2$ b) ako je liječenje započeto sa DAS 28 $\geq 3,2 + 6$ otečenih zglobova/ od 44) pad DAS 28 $\geq 1,2$ u odnosu na početno stanje + 50% manje otečenih zglobova 2. liječenje aktivnog sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa i juvenilnog idiopatskog poliartritisa kod pacijenata od dvije godine i starijih koji nijesu adekvatno odgovorili na prethodnu primjenu NSAID, kortikosteroida i Metotrexata. U slučaju nepodnošljivosti kao i neadekvatnog odgovora na metotrexat lijek se može davati kao monoterapija. Po predlogu Konzilijuma reumatologa Kliničkog centra Crne Gore	rastvor za infuziju	SZK	20mg/ml, 4ml, 10ml, 20ml

L04AX01	azatioprin	tablete	RS;SZ	50mg
L04AX02	thalidomid	tablete	RS;SZ	100mg
indikacije:	multipli mijelom za MKB: C90 Po predlogu specijaliste hematologa			
M	LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOŠTANO-MIŠIČNOG SISTEMA			
M01	ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LJEKOVI			
M01A	NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LJEKOVI			
M01AB05	diklofenak	injekcije	Z;SZ	75mg
		kapsule	R;SZ	75mg
		tablete	R;SZ	50mg; 75mg; 100mg
		supozitorije	R;SZ	12,5mg; 25mg; 50mg
M01AC01	piroksikam	tablete	R;SZ	20mg
		kapsule	R;SZ	10mg; 20mg
M01AB15	ketorolak trometamin	rastvor za injekciju	Z;SZ	30mg/ml
M01AE01	ibuprofen	sirup	R;SZ	100mg/5ml
		tablete	R;SZ	400mg; 600mg
M01AE02	naproksen	film tablete	R, SZ	375mg
M01C	SPECIFIČNA ANTIREUMATSKA SREDSTVA			
M01CC01	penicilamin	tablete	RS;SZ	125mg; 250mg
M03	MIŠIČNI RELAKSANSI			
M03A	MIORELAKSANSI SA PERIFERNIM DJELOVANJEM			
M03AB01	suksametoniјum	injekcije	SZ	100mg; 200mg; 500mg
M03AC01	pankuronijum bromid	injekcije	SZ	4mg/2ml
M03AC03	vekuronijum bromid	prašak za injekcije	SZ	4mg
M03AC09	rokuronijum bromid	injekcije	SZ	50mg/5ml; 100mg/10ml
M03AC11	cisatrakuiјum	injekcije	SZ	5mg/2.5ml, 10mg/5ml, 20mg/10ml, 150mg/30ml
M03AX01	klostridium botulinum tip A toksin	prašak za injekcije	SZK	500ij
indikacije:	fokalne distonije u okviru ekstrapiramidalnog sindroma: 1. spastični tortikolis 2. blefarospazam 3. hemifacijalni spazam Po predlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore			
M03C	MIŠIČNI RELAKSANSI			
M03CA01	dantrolen"		SZK	
indikacije:	1.hronični teški spazam poprečno-prugaste muskulature 2. maligna hipertermija Po predlogu Konzilijuma neurologa i Konzilijuma anesteziologa Kliničkog centra Crne Gore			
M04	LJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA			
M04AA01	alopurinol	tablete	R;SZ	100mg; 300mg
M05	LJEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU			
M05B	LJEKOVI KOJI DJELUJU NA STRUKTURU KOSTI I MINERALIZACIJU			
M05BA	BISFOSFANATI			
M05BA02	klodronat	ampule	SZK	60mg; 300mg
indikacije:	osteoliza kostiju kod malignih oboljenja. Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore			
M05BA04	alendronat	tablete	RS;SZ	10mg, 70mg
indikacije:	1.Za liječenje osteoporoze kod pacijenatkinja posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (MKB: M80; M81). Napomena: lijek se uvodi u terapiju kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrijednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck. Po predlogu specijaliste interne medicine - reumatologa i specijaliste interne medicine – endokrinologa			

M05BA06 indikacije:	ibandronska kiselina za tablete od 50mg: 1. metastaze karcinoma pluća u kostima 2. hiperkalcemija kod malignih oboljenja kostiju Po predlogu hematologa ili onkologa Kliničkog centra Crne Gore za tablete od 150mg: 1. Za liječenje osteoporoze kod pacijenatkinja posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (MKB: M80; M81). Napomena: lijek se uvodi u terapiju kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrijednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck. Po predlogu specijaliste interne medicine - reumatologa i specijaliste interne medicine - endokrinologa	tablete	RS;SZ	50mg, 150mg
	1. za dozu od 2mg/2ml i 6mg/6ml: osteoliza kostiju kod malignih oboljenja. Po predlogu Konzilijuma onkologa, hematologa ili urologa Kliničkog centra Crne Gore. Primjena najduže do godinu dana, s tim da je neophodna evaluacija nakon svaka tri primijenjena ciklusa; 2. za dozu od 3mg/3ml: osteoporoza sa denzitometrijom manjom od - 3,5; potrebno je priložiti snimak osteodenzitometrije, kod žena u postmenopauzi starosne dobi 55 godina i starije te kod kojih nije moguća primjena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primjene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:a) mišljenje o postojanju hroničnog gastritisa, erozivnog gastritisa, ulkusne bolesti, pogoršanja postojeće bolesti jednjaka, želuca ili crijeva, verifikovano gastroskopskim nalazom;b) mišljenje o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije. Po predlogu Konzilijuma reumatologa Kliničkog centra Crne Gore	koncentrat za infuziju	SZK	2mg/2ml; 3mg/3ml; 6mg/6ml
M05BA08 indikacije:	zolendronicna kiselina 1. osteoliza kostiju kod malignih oboljenja 2. metastaze na kostima Po predlogu Konzilijuma onkologa ili hematologa Kliničkog centra Crne Gore i Specijalne bolnice Brezovik	prašak za infuzije	SZK	4mg/5ml;
		koncentrat za infuziju	SZK	4mg/5ml;
M05BB03 indikacije:	alendronska kiselina, holekalciferol 1. Za liječenje osteoporoze kod pacijenatkinja posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (MKB: M80; M81). Napomena: lijek se uvodi u terapiju kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrijednost u L 1-4 ≤ -2.5 ili ≤ -2.5 u Total/Neck. Po predlogu specijaliste interne medicine - reumatologa i specijaliste interne medicine – endokrinologa	tablete	RS;SZ	(70mg+2800i.j.); (70mg+5600i.j.)
N	LJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM			
N01	ANESTETICI			
N01A	OPŠTI ANESTETICI			
N01AB01	halotan	rastvor zainhalaciju	SZ	50ml
N01AB06	izofluran	rastvor za inhalaciju	SZ	100ml
N01AB08	sevofluran	rastvor za inhalaciju	SZ	250ml
N01AF03	tiopental natrijum	lio bočica	SZ	500mg; 1000mg
N01AH01§	fentanil	injekcije	SZ	0,1mg/2ml; 0,5mg/10ml; 2ml (0.05mg/ml); 10ml (0.05mg/ml)
N01AH02§	alfentanil	injekcije	SZ	1mg/2ml; 5mg/10ml 2ml (0.5mg/ml); 10ml (0.5mg/ml)
N01AH06§	remifentanil	injekcije	SZ	1mg/3ml; 2mg/5ml

N01AH51§	fantanil sa droperidolom	injekcije	SZ	(0,05mg+2,5mg)/ml
N01AX03	ketamin	injekcije	SZ	50mg/ml
N01AX07	etomidat	injekcije	SZ	(2mg/ml)10ml
N01AX10	propofol	emulzija (rastvor)	SZ	(10mg/ml)20ml,(20mg/ml)50ml,(10mg/ml)50ml , (10mg/ml)100ml
N01B	LOKALNI ANESTETICI			
N01BB01	bupivakain	injekcije	SZ	(5mg/ml)20ml, (5mg/ml)4ml
N01BB01	bupivakain + glukoza	injekcije	SZ	(5mg+80mg)/ml 4ml
N01BB02	lidokain	injekcije	Z;SZ	(10mg/ml)3,5ml i (20mg/ml)2ml
		sprej	SZ	50ml (100mg/ml)
		gel	SZ	2% (30g)
N01BB08	artikain	injekcije	Z;SZ	20mg/ml
N01BB52	lidokain, adrenalin	injekcije	Z;SZ	(40mg+0,025mg)/2ml
N02	ANALGETICI			
N02A	OPIOIDI			
N02AA01§	morfin	sol	RS;SZ	10mg/5ml;30mg/5ml;100mg/5ml
		tablete	RS;SZ	10mg; 30mg; 60mg; 100mg
		injekcije	SZ	20mg/ml
N02AB02§	petidin	injekcije	SZ	100mg/2ml
N02AB03§	fantanil	transdermalni flasteri	RS;SZ	12mcg/h; 25mcg/h; 50mcg/h, 75mcg/h; 100mcg/h
indikacije:	bolovi u malignitetu, MKB: C00-C97 koji se ne mogu kontrolisati standardnom terapijom			
N02AX02§	tramadol	kapi	RS;SZ	10ml (100mg/ml)
		tablete	RS;SZ	50mg; 100mg; 200mg;
		kapsule	RS;SZ	50mg;
		supozitorije	RS;SZ	100mg
		injekcije	SZ	50mg/1ml; 100mg/2ml
indikacije:	za šifre MKB: C00-C97			
N02B	OSTALI ANALGETICI I ANTIPIRETICI			
N02BA01	acetil salicilna kiselina	tablete	SZ	300mg; 500mg
N02BB02	metamizol	injekcije	Z;SZ	2,5g/5ml
N02BE01	paracetamol	sirup	R;SZ	120mg/5ml
		tablete	SZ	500mg
		supozitorije	SZ	80mg; 120mg; 200mg
		injekcije	SZ	(10mg/1ml) 100ml
N03	LJEKOVI ZA LIJEČENJE EPILEPSIJE			
N03A	ANTIEPILEPTICI			
N03AA02§	fenobarbiton	tablete	RS;SZ	15mg; 100mg
		injekcije	SZ	220mg/2ml
N03AE01	klonazepam	tablete	RS;SZ	0,5mg; 2mg
		injekcije	SZ	1mg/ml
N03AF01	karbamazepin	sirup	RS;SZ	100mg/5ml
		tablete	RS;SZ	200mg; 400mg
N03AG01	natrijum valproat	sirup	RS;SZ	(50mg/ml) 150ml
		tablete	RS;SZ	300mg
N03AG01	natrijum valproat sa valproinskom kiselinom	tablete	RS;SZ	333mg+145mg
N03AX09	lamotrigin	tablete	RS;SZ	25mg; 50mg; 100mg ; 200mg
indikacije:	za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike i za MKB šifru F 31			
N03AX11	topiramat	tablete	RS;SZ	25mg; 50mg; 100mg; 200mg
indikacije:	za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike			
N03AX12	gabapentin	kapsule	RS;SZ	100mg; 300mg; 400mg
indikacije:	za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike			
N03AX14	levetiracetam	tablete	RS;SZ	250mg,500mg, 1000mg
		sirup		100mg/ml
indikacije:	za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neurofiziologa			
N03AX16	pregabalin	kapsule	RS;SZ	75mg, 150mg
indikacije:	za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neurofiziologa			
N04	LJEKOVI ZA LIJEČENJE PARKINSONOVE BOLESTI			
N04A	ANTIHLINERGIČKI LJEKOVI			
N04AA01§	triheksifenidil	tablete	RS;SZ	2mg; 5mg
N04AA02	biperiden	tablete	RS;SZ	2mg

		injekcije	Z;SZ	5mg/ml
N04B	DOPAMINERGIČKI LJEKOVI			
N04BA02	levodopa, benzerazid	tablete	RS;SZ	200mg+50mg
N04BC04	ropinirol	tablete	RS;SZ	0,25mg; 1 mg; 2 mg; 5mg
		tablete sa produženim oslobađanjem	RS;SZ	2mg;4mg;8mg
N04BC05	pramipeksol	tablete	RS;SZ	0,25mg; 1mg
		tablete sa produženim oslobađanjem	RS;SZ	0,375mg; 0,75mg;1,5mg;3mg
indikacije:	za liječenje uznapredovalog stadijuma Parkinsonove bolesti za MKB: G20; G21; G22; sa razvojem slabljenja dejstva levodope i/ili pojave oscilacije			
N05	PSIHOLEPTICI			
N05A	ANTIPISIHOTICI			
N05AA01	hlorpromazin	tablete	RS;SZ	25mg;
		ampule	Z;SZ	25mg/1ml; 50mg/2ml
N05AA02	levomepromazin	tablete	RS;SZ	25mg; 100mg
N05AB02	flufenazin	dražeje	RS;SZ	1mg; 2,5mg; 5mg
		injekcije	Z;SZ	25mg/ml
		tablete	RS;SZ	1mg; 2,5mg; 5mg
N05AC02	tioridazin	dražeje	RS;SZ	25mg; 100mg
N05AD01	haloperidol	kapi	SZ	10ml (2mg/ml)
		tablete	RS;SZ	2mg; 10mg
		injekcije	Z;SZ	5mg/ml; 50mg/ml
N05AF05	zuklopentiksol	ampule	SZK	50 mg, 200 mg
		film tablete	RK;SZK	10mg, 25mg
indikacije:	1.akutne i hronične psihoze za bolesnike koji su rezistentni na klasične antipsihotike; 2. šizofrenija Po predlogu konzilijuma psihijata Kliničkog centra Crne Gore ili konzilijuma Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru			
N05AH02	klozapin	tablete	RS;SZ	25mg; 100mg
indikacije:	za bolesnike sa rezistencijom na druge neuroleptike			
N05AH03	olanzapin	tablete	RS;SZ	5mg; 10mg
indikacije:	za duševne bolesnike sa refrakternim oblicima bolesti (F20-29) na klasičnu terapiju ili zbog nepodnošenja klasične terapije (uključujući klozapin) Po predlogu specijaliste psihijatra			
N05AL01	sulpirid	tablete	RS;SZ	200mg
		injekcije	SZ	100mg/2ml
N05AN01	litijum karbonat	kapsule	RS;SZ	300mg
		tablete	RS;SZ	300mg
N05AX08	risperidon	tablete	RS;SZ	1mg; 2mg; 3mg; 4mg
		prašak za injekcije	Z;SZ	25mg; 37,5mg; 50mg
indikacije:	za prašak za injekcije: 1. akutne i hronične psihoze za bolesnike koji su rezistentni na klasične antipsihotike 2. šizofrenija prve epizode šizofrenije kod osoba do 35 godine života Samo za pacijente koji ne sarađuju u sprovođenju terapije u fazi pogoršanja bolesti, nakon prethodne terapije sa oralnim risperidonom. Po predlogu specijaliste psihijatra			
N05B	ANKSIOLITICI			
N05BA01	diazepam	mikroklizme	R;SZ	5mg/2,5ml
		ampule	Z;SZ	10mg/2ml
		dražeje	R;SZ	2mg; 5mg; 10mg
		tablete	R;SZ	2mg; 5mg; 10mg
N05BA06	lorazepam	injekcije	SZ	2mg/ml
		tablete	RS;SZ	1mg; 2,5mg
N05BA08	bromazepam	tablete	R;SZ	1,5mg; 3mg; 6mg
N05BA12	alprazolam	tablete	RS;SZ	0,25mg; 0,5mg; 1mg
N05C	HIPNOTICI I SEDATIVI			
N05CD02	nitrazepam	tablete	R;SZ	5mg

N05CD08	midazolam	ampule	SZ	5mg/5ml; 15mg/3ml
N05CF02	zolpidem	tablete	R;SZ	5mg;10mg
N06	PSIHOANALEPTICI			
N06A	ANTIDEPRESIVI			
N06AA04	klomipramin	injekcije	SZ	25mg/2ml
		ampule	SZ	20mg/2ml
		dražeje	RS;SZ	25mg
		tablete	RS;SZ	25mg
N06AA09	amitriptilin	ampule	SZ	20mg/2ml
		tablete	RS;SZ	10mg; 25mg
N06AA21	maprotilin	ampule	SZ	25mg/5ml
		tablete	RS;SZ	25mg, 50mg
N06AB03	fluoksetin	tablete	RS;SZ	20mg
		kapsule	RS;SZ	20mg
N06AB05	paroksetin	tablete	RS;SZ	20mg; 30mg
N06AB06 indikacije:	sertralin 1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4). Napomena: Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5 samo za osobe starije od 6 godina. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	film tablete	RS; SZ	50mg,100mg
N06AX03	mianserin	tablete	RS;SZ	30mg; 60mg
N06D	LJEKOVI ZA TERAPIJU DEMENCIJE			
N06DX01 indikacije:	memantin Alzheimerova bolest za MKB: F00, G30 Po predlogu specijaliste psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa	film tablete	RS;SZ	10mg
N07	OSTALI LJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM			
N07A	PARASIMPATOMIMETICI			
N07AA01	neostigmin	injekcije	SZ	0,5mg/ml
N07AA02	piridostigmin	dražeje	RS;SZ	60mg
N07B	LJEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA BOLESTI ZAVISNOSTI			
N07BC01 &	buprenorfin	sublingvalna tableta	RS;SZ	0.4mg; 2mg; 8mg
N07BC02 §	metadon	kapi	RS;SZ	10mg/ml
		tablete	RS;SZ	5mg
N07XX02 indikacije:	riluzol amiotrofična lateralna skleroza; MKB-G12.2 Po predlogu specijaliste neurologa	tablete	RS;SZ	50mg
P	LJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA UZROKOVANIH PARAZITIMA			
P01	ANTIPROTOZOICI			
P01BA01	hlorohin	tablete	RS;SZ	250mg
P01BA02	hidroksi-hlorokin	tablete	RS;SZ	200mg
P02	ANTIHELMINTICI			
P02C	LJEKOVI PROTIV NEMATODA			
P02CA01	mebendazol	sirup	R;SZ	(100mg/5ml)30ml
		tablete	R;SZ	100mg
P02CA03 indikacije:	albendazol za šifre MKB: B67 i B69	tablete	RS;SZ	400mg; 200mg
P03	LJEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA, SKABICIDI, INSEKTICIDI			
P03A	LJEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA I SKABIJESA			
P03AX01	benzil benzoat	emulzija	R;SZ	25%
R	LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA			
R03	LJEKOVI KOJI SE PRIMJENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI			
R03A	ADRENERGICI, INHALACIONI			
R03AC02	salbutamol	sirup	R;SZ	2mg/5ml
		tablete	R;SZ	2mg
		rastvor za inhalaciju	R;SZ	5mg/ml
		sprej za inhalaciju	R;SZ	0,1mg/dozi

R03AC12 indikacije:	salmeterol 1.bronhijalna astma, uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima za MKB: J45; 2.hronična opstruktivna bolest pluća za umjereno teške, teške i veoma teške (II,III i IV stadijum) oblike bolesti za MKB; J44; Po predlogu pulmologa,pneumoftiziologa ili pedijatra pulmologa.	sprej za inhalaciju	RS;SZ	25mcg/dozi
R03AK03	fenoterol, ipratropijum bromid	rastvor za inhalaciju	RS;SZ	(0,5mg+0,25mg)/ml
		sprej za inhalaciju	RS;SZ	(0,05mg+0,021mg)/dozi
R03AK06 indikacije:	flutikazon propionat, salmeterol za šifre MKB: J44; J45, za dozu (100+50)mcg: za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme Po predlogu specijaliste pedijatra – pulmologa za doze (250+50)mcg i (500+50)mcg: za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme i bolesnika sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (HOBP) s FEV manje od 60% i učestalim egzacerbacijama bolesti uprkos terapiji bronhodilatatorima Po predlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urađenog spirometrijskog nalaza	prašak za inhalaciju (diskakuhaler)	RS;SZ	(100+50)mcg; (250+50)mcg; (500+50)mcg
R03AK07 indikacije:	budesonid + formoterol za šifre MKB: J44 i J45 za dozu (320+9)mcg: za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme i bolesnika sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (HOBP) s FEV manje od 50% i učestalim egzacerbacijama bolesti uprkos terapiji bronhodilatatorima za doze (80+4,5)mcg i (160+4,5)mcg: za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme Po predlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urađenog spirometrijskog nalaza	prašak za inhalaciju (diskakuhaler)	RS;SZ	(320+9)mcg; (80+4,5)mcg;(160+4,5)mcg
R03B	OSTALI LJEKOVI ZA OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI, INHALACIONI			
R03BA02	budesonid	suspencija za inhalaciju	RS;SZ	2ml (0,125mg/ml), 2ml (0,25mg/ml) 2ml (0,5mg/ml)
		prašak za inhalaciju (disk akuhaler)	RS;SZ	200mcg/dozi; 400mcg/dozi
R03BA05	flutikazon	sprej za inhalaciju	RS;SZ	50mcg/dozi; 125mcg/dozi;250mcg/dozi
R03BA08	ciklesonid	rastvor za inhalaciju	RS SZ	(120 doza po 80 mcg)10 ml; (60 doza po 160 mcg)5 ml
R03BB04 indikacije:	tiotropijum bromid hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih umjereno teške, teške i veoma teške (II, III i IV stadijum) oblike bolesti za MKB: J44. Po predlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urađenog spirometrijskog nalaza	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	RS;SZ	18mcg
R03D	DRUGI LJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA			
R03DC03 indikacije:	montelukast Bronhijalna astma za MKB: J45, Po predlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urađenog spirometrijskog nalaza .	granule	RS;SZ	4mg
		tablete za žvakanje	RS;SZ	4mg; 5mg
		film tablete	RS;SZ	10mg

R03DA04	teofilin	kapsule	RS;SZ	125mg; 250mg
R03DA05	aminofilin	injekcije	Z;SZ	250mg/10ml
		tablete	RS;SZ	100mg; 350mg
R05	LJEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE			
R05C	EKSPETORANSI, ISKLJUČUJUĆI KOMBINACIJE SA ANTITUSICIMA			
R05CB13	dornaze alfa	rastvor za inhalaciju	SZK	2,5mg/2,5ml
indikacije:	cistična fibroza sa forsiranim vitalnim kapacitetom > 40% Po predlogu Konzilijuma pedijatar Kliničkog centra Crne Gore ili Konzilijuma pulmologa Kliničkog centra Crne Gore			
R05DB13	butamirat	sirup	SZ	4mg/5ml
		tablete	SZ	20mg; 50mg
R06	ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU UPOTREBU			
R06AC03	hloropiramin	injekcije	Z;SZ	20mg/2ml
R06AX13	loratadin	sirup	RS;SZ	5mg/5ml
		tablete	R;SZ	10mg
R07	OSTALI LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA DISAJNE ORGANE			
R07AA02	poraktant alfa	injekcije	SZK	120mg/1,5ml; 240mg/3ml
indikacije:	1.respiratorni distress sindrom kod prijevremeno rođene djece Po predlogu Konzilijuma neonatologa Kliničkog centra Crne Gore			
S	LJEKOVI KOJI DJELUJU NA OKO I UHO			
S01	LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA			
S01A	ANTIMIKROBNI I ANTIVIRUSNI LJEKOVI			
S01AA01	hloramfenikol	mast za oči	R;SZ	1%
S01AA11	gentamicin	kapi za oči	R;SZ	0,30%
		mast za oči	R;SZ	0,30%
S01AA30	bacitracin, neomicin	mast za oči	R;SZ	5g
S01AD03	aciklovir	mast za oči	RS;SZ	3%
S01AX13	ciprofloksacin	kapi za oči	R;SZ	0,30%
S01B	GLUKOKORTIKOIDI I KOMBINACIJE			
S01BA04	prednizolon	kapi za oči	RS;SZ	0,50%
S01BC03	diklofenak	kapi za oči	R;SZ	0,10%
S01C	ANTIINFLAMATORNI LJEKOVI U KOMBINACIJI SA ANTIINFEKTIVIMA			
S01CA01	neomicin, deksametazon	kapi za oči	R;SZ	0,35% + 0,1%
S01E	LJEKOVI ZA LIJEČENJE GLAUKOMA I MIOTICI			
S01EB01	pilocarpin	kapi za oči	RS;SZ	2,00%
S01EC01	acetazolamid	tablete	RS;SZ	250mg
S01EC03	dorzolamid	kapi za oči	RS;SZ	2%
indikacije:	za refrakterne slučajeve na uobičajenu antiglaukomatозnu terapiju, po preporuci oftalmologa			
S01ED01	timolol	kapi za oči	RS;SZ	0,50%
S01ED51	dorzolamid, timolol	kapi za oči	RS;SZ	2%+0,5%
indikacije:	za liječenje glaukoma (MKB:H40) kao druga terapijska linija, kada primjena u monoterapiji: timolola, inhibitora karboanhidraze (dorzolamid) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta			
S01F	MIDRIJATICI I CIKLOPLEGICI			
S01FA01	atropin	kapi za oči	RS;SZ	0,5%; 1%
S01FA06	tropikamid	kapi za oči	RS;SZ	0,5%; 1%
S01FB01	fenilefrin	kapi za oči		2,5%, 5%, 10%
S01G	DEKONGESTIVI I ANTIALERGICI			
S01G....	natrijum hlorid	mast za oči	RS;SZ	5%
		kapi za oči	RS;SZ	5%
S01H	LOKALNI ANESTETICI			
S01HA03	tetrakain	kapi za oči	RS;SZ	0,5%
S01J	DIJAGNOSTICI U OFTALMOLOGIJI			
S01JA01	fluorescein	kapi za oči	RS;SZ	0,5%; 1%; 2%
		ampule	SZ	10%; 20%
		štapići	SZ	
S01K	HIRURŠKA POMOĆNA SREDSTVA			
S01KA02	hipromeloza	kapi za oči	SZ	0,5%

S01L	LJEKOVI ZA POREMEĆAJ CIRKULACIJE U OKU		
S01LA04	ranibizumab	Rastvor za injekciju	Z 10mg/ml
V	OSTALI LJEKOVI		
V03	OSTALI PREPARATI ZA LIJEČENJE RAZNIH BOLESTI		
V03AB	ANTIDOTI		
V03AB14	protamin sulfat	injekcije	SZ 50mg/5ml
V03AB15	nalokson	ampule	Z;SZ 400mcg/ml
V03AB23	acetilcistein	injekcije	SZ 300mg/3ml
indikacije:	kao antidot kod trovanja paracetamolom		
V03AB25	flumazenil	injekcije	SZ 0,5mg/5ml; 1mg/10ml
V03AB35	sugamadeks	rastvor za inj.	SZK 100mg/ml
indikacije:	antidot kod reverzibilne muskularne blokade izazvane rokuronijumom ili vekuronijumom Po predlogu Konzilijuma anesteziologa Kliničkog centra Crne Gore		
V03AE	LJEKOVI ZA LIJEČENJE HIPERKALIJE MIJE		
V03AE02	sevelamer	tablete	RS;SZ 800mg
indikacije:	regulacija hiperfosfatemije kod bolesnika na dijalizi kod kojih se drugim mjerama, uključujući i maksimalno moguću primjenu vezivaca fosfata sa kalcijumom nije postigao zadovoljavajući nivo fosfata u serumu Po predlogu ljekara specijaliste interniste - nefrologa ili specijaliste ljekara u centrima za dijalizu		
V03AF	LJEKOVI ZA DETOKSIKACIJU U TERAPIJI ANTINEOPLASTICIMA		
V03AF03	kalcijum folinat	injekcije	SZ 30mg/3ml; 50mg/5ml; 300mg/30ml
V04	DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA		
V04CF01	PPD tuberkulin	bočice	Z;SZ 2,5ml
V06DX01	dijetetski preparat	prašak	RS;SZ 400g
indikacije:	1. preosjetljivost na bjelančevine mlijeka i soje/alergija na hranu MKB: K90.4, malapsorpcija zbog intolerancije 2. sindrom kratkog crijeva (urođeni, nakon hiruške resekcije) MKB: K91.2, malapsorpcija poslije hirurškog zahvata 3. izrazita proteinsko energetska malnutricija (kvašior) MKB: E40.0, teška proteinska pothranjenost za MKB: E43.0, nespecifična teška proteinsko energetska pothranjenost 4. cistična fibroza MKB: E845. atopijski dermatitis MKB: L20 Upotreba kod odojčadi do navršanih 6 mjeseci života, mjesečno 1200 - 2000 g, zavisno od tjelesne mase djeteta i mjeseci života. Po predlogu specijaliste pedijatra Kliničkog centra Crne Gore		
V06DX01	dijetetski preparat	prašak	RS;SZ 400g
indikacije:	1. preosjetljivost na bjelančevine mlijeka i soje/alergija na hranu MKB: K90.4, 2. atopijski dermatitis MKB: L20 Upotreba kod odojčadi do navršanih 6 mjeseci života, mjesečno 2000 g zavisno od tjelesne mase djeteta Po predlogu specijaliste pedijatra Kliničkog centra Crne Gore		
V06DX01	dijetetski preparat	prašak	RS;SZ 400g
indikacije:	1. alergija na proteine kravljeg mlijeka i soje 2. multiple alergije na hranu Upotreba kod odojčeta do navršanih 6 mjeseci života, mjesečno 1200 - 2000 g zavisno od tjelesne mase djeteta Po predlogu specijaliste pedijatra Kliničkog centra Crne Gore		
V06DX02	bezglutenski proizvod	prašak	RS;SZ 1000 g
indikacije:	celijakija, MKB: K90.0 za djecu od 1 do 5 godine – 4 kg za mjesec dana za djecu od 5 do 10 godina – 5 kg za mjesec dana za djecu od 10 do 15 godina – 7 kg za mjesec dana za starije od 15 godina – 10 kg za mjesec dana Po predlogu gastroenterologa Kliničkog centra Crne Gore		

V07	OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI			
V07AB	aqua pro injectione	ampule	Z;SZ	1ml; 2ml; 5ml; 10ml
V08	KONTRASTNA SREDSTVA			
V08A	KONTRASTNA SREDSTVA SA JODOM			
V08AA01	meglumin amidotrizoat, natrijum amidotrizoat	infuzije	SZ	(76%) 100ml
V08AA05	joksitaminska kiselina	bočice	SZ	100 ml (300mg joda/ml)
V08AB02	joheksol	rastvor za injekciju	SZ	50ml; 100ml; 200ml
V08AB05	jopromid	rastvor za infuziju	SZ	50ml, 100ml (300mg joda/ml); 50ml, 100ml, 200 ml, 500ml (370 mg joda /ml)
V08AB07	joversol	infuzije	SZ	(300mg joda/ml)50ml; (350mg joda/ml)50ml
V08AB11	jobitridol	rastvor za injekciju	SZ	(300mg joda/ml) od 50ml i 100ml; (350mg joda/ml) od 50ml i 100ml
V08B	KONTRASTNA SREDSTVA BEZ JODA			
V08BA01	barijum sulfat	suspenzija prašak	SZ	(100%) 200ml; 5000ml
V08C	KONTRASTNA SREDSTVA ZA MAGNETNU REZONANCU			
V08CA01	gadopentetat dimeglumin	injekcije	SZ	(469,01mg/ml); 20ml;
V08CA02	gadoterična kiselina	injekcije	SZ	(05mmol/ml) 15ml;20ml
V08CA09	gadobutrol	rastvor za injekciju	SZ	(1mmol/ml) 7,5ml; 15ml; 30ml
V08CA10	gadoksetinska kiselina	rastvor za injekciju	SZ	(0,25mmol/ml) 10ml

LEGENDA:

1. R - lijek se izdaje na osnovu recepta propisanog od:
 - izabranog doktora;
 - izabranog stomatologa;
 - pedijatra iz Centra za djecu sa posebnim potrebama (ljekove iz svoje specijalnosti);
 - pneumoftiziologa iz Centra za plućne bolesti i TBC (ljekove koji djeluju na TBC);
 - psihijatra iz Centra za mentalno zdravlje (ljekove koji djeluju na nervni sistem).
2. RS - lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, koji je propisan na osnovu izvještaja doktora specijaliste određene grane medicine.
3. RZ - lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, koji je propisan na osnovu terapije predložene u otpusnoj listi.
4. Z - lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite.
5. SZ - lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.
6. RK - lijek se primjenjuje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu mišljenja konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore i mišljenja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.
7. SZK- lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, na osnovu mišljenja konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore i mišljenja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.
8. # - rezervni antibiotik propisuje se u skladu sa protokolom zdravstvene ustanove.
9. & - droga, snažan uticaj lijeka na psihofizičke sposobnosti.