




Prikaz lovnih područja u Crnoj Gori

Afrička kuga svinja je virusna, veoma opasna zarazna bolest domaćih i divljih svinja!

Bolest se širi:

- Kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama;
- Ishranom svinja pomijama u kojima ima kontaminiranih ostataka hrane;
- Kontaminiranom hranom, vodom;
- Inficiranim krpeljima; odjećom i obućom;
- Kontaminiranim predmetima i opremom;
- Prevoznim sredstvima;
- Stajnjakom;
- Leševima uginulih i zaklanih životinja, glodarima i insektima.

Preventivne mjere:

- ne hraniti svinje pomijama;
- izbjegavati držanje svinja na paši;
- spriječiti direktan kontakt divljih sa domaćim svinjama;
- osobe koje su bile u kontaktu sa divljim svinjama moraju dobro oprati i dezinfikovati odjeću i obuću;
- obavezna je prijava svake bolesne ili uginule domaće ili divlje svinje nadležnom veterinaru;
- postaviti dezobarijere na ulazu i izlazu u objekat gdje se drže svinje.



**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG
RAZVOJA**

AFRIČKA KUGA SVINJA

**Obaveze korisnika lovišta i lovaca u prevenciji
i suzbijanju afričke kuge svinja**



UPUTSTVO ZA LOVCE

**UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I
FITOSANITARNE POSLOVE**

Adresa: Serdara Jola Piletića br. 26, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 201-945; +382 20 621-111;

Fax: +382 20 201-946; +382 20 621-008;

E-mail: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me

Svako obolijevanje ili uginuće divljih svinja obavezno treba prijaviti nadležnom veterinarskom inspektoru (sa ciljem uzimanja uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja na AKS i KKS);

- Od divljih svinja stradalih od udara automobila na putevima takođe je obavezno uzorkovanje (dio slezine, limfnih čvorova, krajnika-tonzila i bubrega) radi laboratorijskih ispitivanja na AKS i KKS.

- U lovište ne smijete ostaviti za sobom otpatke hrane koja sadrži ostatke hrane životinjskog porijekla;

- Na gazdinstvima sa domaćim svinjama zabranjeno je prihvatanje i držanje divljih svinja;

Kako prepoznati afričku kugu svinja:

Iznenadno uginuće jedne i više svinja, gubitak apetita, potištenost, povišena tjelesna temperatura do 42°C, krvarenja po koži (najčešće po ušima, nogama, repu, stomaku i bočnim stranama trupa), krvav proliv, pobačaji, nekoordinisanost u hodu, otežano disanje, kašalj, povraćanje;

Posebno važno:

- ❖ **oboljevaju svinje svih kategorija**
- ❖ **uginu sve oboljele životinje**
- ❖ **virus afričke kuge svinja ne predstavlja opasnost za ljude i druge vrste životinja**
- ❖ **nema liječenja afričke kuge svinja**
- ❖ **vakcina ne postoji**
- ❖ **u slučaju pojave afričke kuge svinja obavezno je ubijanje svih svinja na gazdinstvu.**

Ukoliko na gazdinstvu držite domaće svinje, obavezno, nakon svakog dolaska iz lova i lovišta promijenite odjeću i izbjegavajte hranjenje ili čišćenje objekata u kojima držite svinje;

- Useljavanje divljih svinja u ograđena lovišta (npr. gatera, uzgajivališta), ili izmještanje divljih svinja u prirodu (tzv. "otvorena lovišta"), prethodno obavezno prijavite nadležnom veterinarskom inspektoru.

- Lovci koji dolaze iz zemlje zaraženih sa AKS ne smiju da donose sa sobom namirnice pripremljene od svinjskog mesa porijeklom od domaćih i divljih svinja.

AKS se često prenosi kontaminiranom hranom.

Radnici koji rade na farmi svinja ili gazdinstvima svinja, a bave se lovom prije započinjanja rada obavezni su da prijave rukovodiocu farme da su učestvovali u takvom lovu u kojem je uočeno neprirodno ponašanje ili sumnja na bolest kod divljih svinja.

- Procijeniti u lovištu broj divljih svinja i gustinu populacije divljih svinja, a zatim u njima pratiti kretanje i svaku promjenu brojnog stanja jer izumiranje pojedinačnih stada divljih svinja može biti prvi znak AKS;

- Sprovoditi stalni nadzor na hranilištima i pojilištima. Njihova sistemska kontrola može dati važne podatke o kretanju zaraze;

- Obavezno je sprovođenje propisanog monitoringa bolesti na AKS i KKS kod divljih svinja i u skladu sa tim obavezno je slanje propisanog broja uzoraka iz svakog lovišta u Specijalističku veterinarsku laboratoriju;

- Kod odstrijela divljih svinja uzorkovati krv iz srca u serološkim epruvetama (ili, ako to nije moguće, krv iz većeg krvnog suda ili tkivnu tečnost), dio slezine, limfni čvor, dio krajnika-tonzila i dio bubrega. Sve uzorke je potrebno držati rashlađene na temperaturi frižidera.

Uzorke dostaviti lokalnoj veterinarskoj ambulanti koja će ih uz uredno popunjen obzazac zahtjeva za laboratorijsko ispitivanje dostaviti u Specijalističku veterinarsku laboratoriju.