

PRILOG

ZAHTEVI ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA POSEBNE NUTRITIVNE POTREBE

Posebna nutritivna potreba	Osnovna nutritivna svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeni period korišćenja	Ostali zahtjevi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Poboljšavanje rada bubrega u slučaju hronične bubrežne insuficijencije	Visokokvalitetni proteini i ograničeni nivoi fosfora najviše 5g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadrjem vlage od 12% i sirovih proteini najviše 220g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadrjem vlage od 12% ili Smanjena apsorpcija fosfora uključivanjem lantan karbonat oktahidrata	Psi	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	HRANA ZA ŽIVOTINJE STAVLJA SE NA TRŽIŠTE KAO POTPUNA KRMNA SMJESA; PREPORUČENA SVARLJIVOST PROTEINA: NAJMANJE 85%; NA OZNACI NAVODI SE: „PREPORUČUJE SE PRIJE KORIŠĆENJA ILI PRODUŽENJA KORIŠĆENJA ZATRAŽITI SAVJET OD VETERINARA.“ NA UPUTSTVU O KORIŠĆENJU NAVODI SE: „VODA MORA BITI UVJEK DOSTUPNA“.
		Odrasli psi	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate) Lantan karbonat oktahidrat	Do šest mjeseci	NA OZNACI NAVODI SE: „PREPORUČUJE SE PRIJE KORIŠĆENJA ILI PRODUŽENJA KORIŠĆENJA ZATRAŽITI SAVJET VETERINARA.“ U UPUTSTVU O KORIŠĆENJU NAVODI SE: „VODA MORA BITI UVJEK DOSTUPNA“
	Visokokvalitetni proteini i ograničeni nivoi fosfora najviše 6,2 g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadrjem vlage od 12% i sirovih proteini najviše 320g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadrjem vlage od 12% ili	Mačke	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	HRANA ZA ŽIVOTINJE STAVLJA SE NA TRŽIŠTE KAO POTPUNA KRMNA SMJESA. PREPORUČENA SVARLJIVOST PROTEINA: NAJMANJE 85%. NA OZNACI SE NAVODI: „PREPORUČUJE SE PRIJE KORIŠĆENJA ILI PRODUŽENJA KORIŠĆENJA ZATRAŽITI SAVJET VETERINARA.“ U UPUTSTVU O KORIŠĆENJU NAVODI SE: „VODA MORA BITI UVJEK DOSTUPNA.“
	Smanjena apsorpcija fosfora uključivanjem lantan karbonat oktahidrata	Odrasle mačke	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate) Lantan karbonat oktahidrat	Do šest mjeseci	NA OZNACI NAVODI SE: „PREPORUČUJE SE PRIJE KORIŠĆENJA ILI PRODUŽENJA KORIŠĆENJA ZATRAŽITI SAVJET VETERINARA.“ U UPUTSTVU O KORIŠĆENJU NAVODI SE: „VODA MORA BITI UVJEK DOSTUPNA.“
Za topljenje struvitnih kamenaca	Svojstvo acidifikacije mokraće, nizak nivo magnezijuma, ograničen nivo visoko kvalitetnih proteini	Psi	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Magnezijum Hloridi Sumpor Materije koje acidifikuju mokraću	Pet do 12 nedjelja	U UPUTSTVU O KORIŠĆENJU NAVODI SE: „VODA MORA BITI UVJEK DOSTUPNA.“ NA PAKOVANJU, REZERVOARU ILI OZNACI NAVODI SE: „PREPORUČUJE SE PRIJE KORIŠĆENJA ZATRAŽITI SAVJET VETERINARA.“
	Svojstvo acidifikacije mokraće i nizak nivo magnezijuma	Mačke	Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Magnezijum Hloridi Sumpor Ukupni taurin Materije koje acidifikuju mokraću		
Za smanjenje ponovne pojavе struvitnih kamenaca	Svojstvo acidifikacije mokraće i umjereni nivo magnezijuma	Psi i mačke	Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Magnezijum Hloridi Sumpor Materije koje acidifikuju mokraću	Do šest mjeseci	NA PAKOVANJU, POSUDI ILI OZNACI NAVODI SE: „PREPORUČUJE SE PRIJE KORIŠĆENJA ZATRAŽITI SAVJET VETERINARA.“
Za smanjenje nastanka uratnih kamenaca	Nizak nivo purina, nizak nivo visoko kvalitetnih proteini	Psi i mačke	Izvor proteina	Do šest mjeseci ili doživotno, u slučajevima irreverzibilnog poremećaja metabolizma mokraće kiseline	NA PAKOVANJU, POSUDI ILI OZNACI NAVODI SE: „PREPORUČUJE SE PRIJE KORIŠĆENJA ZATRAŽITI SAVJET VETERINARA.“
Za smanjenje nastanka oksalatnih	Nizak nivo kalcijuma, nizak nivo vitamina D, svojstvo alkalizovane mokraće	Psi i mačke	Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Magnezijum	Do šest mjeseci	NA PAKOVANJU, POSUDI ILI OZNACI NAVODI SE: „PREPORUČUJE SE PRIJE KORIŠĆENJA ZATRAŽITI SAVJET VETERINARA.“

kamenaca			Hloridi Sumpor Ukupni D vitamin Hidroksi-prolin Materije koje alkalizuju mokraću		
Za smanjenje nastanka cistinskih kamenaca	Nizak nivo proteina, umjeren nivo sumpornih amino-kisjelina, svojstvo alkalizovane mokraće	Psi i mačke	Ukupne sumporne amino-kiseline Natrijum Kalijum Hloridi Sumpor Materije koje alkalizuju mokraću	Do jedne godine	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.“
Za smanjenje intolerancije na sastojke i hranljive materije	Odabrani izvor proteina	Psi i mačke	Izvor proteina Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina (ako su dodate)	Tri do osam nedelja: ako znaci intolerancije nestanu, ovom se hranom za životinje može hraniti neograničeno dugo	
	i/ili Odabrani izvor ugljenohidrata		Izvor ugljenohidrata Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina (ako su dodate)		
Za smanjenje akutnih poremećaja resorpkcije u crijevima	Povećan nivo elektrolita i lako svarljivih materija	Psi i mačke	Lako svarljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade Natrijum Kalijum Izvor sluzi (ako su dodate)	Jedna do dvije nedelje	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Kod akutnog proliva i tokom oporavka od akutnog proliva.“ i „Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet veterinara.“
Za postizanje ravnoteže hranljivih materija pri maldigestiji	Lako svarljivi sastojci, nizak nivo masti	Psi i mačke	Lako svarljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade	Tri do 12 nedelja, a doživotno u slučajevima hronične insuficijencije pankreasa	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet veterinara.“
Za poboljšanje rada srca u slučaju hroničnog zastoja srca	Nivo natrijuma mora biti manji od 2,6 g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadržajem vlage od 12%	Psi i mačke	Magnezijum Kalijum Natrijum	Do šest mjeseci	hrana za životinje stavlja se na tržiste kao potpuna krmna smjesa. Na oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.“
Za regulaciju snabdijevanja glukozom (Diabetes mellitus)	Nizak nivo ugljenohidrata koji brzo otpuštaju glukozu	Psi i mačke	Izvor ugljenohidrata Prema potrebi, postupak prerade ugljenohidrata Skrob Ukupni šećer Fruktosa (ako je dodata) Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina (ako su dodate) Izvor kratko- i srednje-lančanih masnih kisjelina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.“
Za poboljšanje rada jetrenih funkcija u slučaju hronične insuficijencije jetre	Visoko kvalitetni proteini, umjeren nivo proteina, visok nivo esencijalnih masnih kisjelina i visok nivo lako svarljivih ugljenohidrata	Psi	Izvor proteina Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina Lako svarljivi ugljenohidrati, a prema potrebi i način njihove prerade Natrijum Ukupni bakar	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara. U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.“
	Visoko kvalitetni proteini, umjeren nivo proteina, visok nivo esencijalnih masnih kisjelina	Mačke	Izvor proteina Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina Natrijum Ukupni bakar	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara. U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.“
Za regulaciju metabolizma lipida u slučajevima hiperlipidemije	Nizak nivo masti i visok nivo esencijalnih masnih kisjelina	Psi i mačke	Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina Sadržaj n-3 masnih kisjelina (ako su dodate)	Do dva mjeseca	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.“
Za smanjenje nivoa joda u hrani za životinje u slučaju hipertireoze	Ograničen nivo joda: najviše 0,26 mg/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa djelom vlage od 12%	Mačke	Ukupni jod	Do tri mjeseca	hrana za životinje stavlja se na tržiste kao potpuna krmna smješa. Na oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.“
Za smanjenje nivoa bakra u jetri	Ograničen nivo bakra: najviše 8,8 mg/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadržajem vlage od 12%	Psi	Ukupni bakar	Do šest mjeseci	hrana za životinje stavlja se na tržiste kao potpuna krmna smješa. Na oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.“
Za smanjenje prekomjerne tjelesne težine	Nizak nivo energije		Energetska vrijednost	Dok se ne postigne željena tjelesna težina	U uputstvu o korišćenju se mora navodi se odgovarajući dnevni obrok
	Visoka kaloričnost, visoka koncentracija esencijalnih hranljivih materija i lako svarljivih sastojaka	Psi i mačke	lako svarljivi sastojci i, prema potrebi, način njihove prerade; energetska vrijednost; sadržaj n-3 i n-6 masnih kisjelina (ako su dodate).	Do pos izanja oporavka	Ako je posebno navedeno da se hrana za životinje daje sondom, na oznaci se navodi: „Davati pod nadzorom veterinara.“
Za uvođenje uobičajenog	Dopunska krmna smješa	Psi	Enterococcus faecium DSM	Deset do 15 dana	Upustva za upotrebu hrane za životinje

hranjenja i/ili oporavak	može sadržavati <i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415 u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješti.		10663/NC MB 10415 uključujući dodatu količinu		obezbeđuje se poštovanje najviše količine stabilizatora crijevne flore/mikroorganizama za potpunu krmnu smještu. Preporučuje se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti savjet veterinara."
Za poboljšanje funkcije kože u slučajevima dermatoze ili prekomernog gubitka dlake	Visok nivo esencijalnih masnih kisjelina	Psi i mačke	Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina	Do dva mjeseca	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: Preporučuje se prije korištenja zatražiti savjet veterinara."
Za regulaciju metabolizma zglobova u slučaju osteoartritisa	Psi: Najmanji dio suve materije sadržan u ukupnoj količini omega – 3 masnih kisjelina 3,3% i eikosapentaenoičnoj kiselini (EPA) 0,38%. Primjereno nivo vitamina E. Mačke: Najmanji dio suve materije sadržane u ukupnoj količini omega – 3 masnim kisjelinama 1,2% i dekosaheksaprotoenoičnoj kiselini (DHA) 0,28%. Povećan nivo metionina i mangana. Odgovarajući nivo vitamina E.	Psi i mačke	Psi: Ukupne omega-3 masne kisjeline Ukupna EPA Ukupni vitamin E Mačke: Ukupne omega-3 masne kiseline Ukupna DHA Ukupni metionin Ukupni mangan Ukupni vitamin E	Do tri mjeseca	Preporučuje se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti savjet veterinara."
Za smanjenje rizika od pojave mlječeće groznice	Nizak nivo kalcijuma i/ili Nizak odnos katjona/anjona ili -.Visok nivo zeolita (sintetički natrijum aluminijum silikat) ili Visok nivo kalcijuma (u obliku vrlo dostupnih kalcijumovih soli)	Krave za mužu	Kalcijum Fosfor Magnezijum Kalcijum Fosfor Natrijum Kalijum Hloridi Sumpor Sadržaj sintetičkog natrijum aluminijum silikata Ukupan sadržaj kalcijuma, izvori i pojedinačne količine kalcijuma	Jedna do četiri nedelje prije teljenja Jedna do četiri nedelje prije teljenja Dvije nedelje prije teljenja Započeti kod prvih znaka teljenja do dva dana nakon teljenja	U uputstvu o korištenju naznačiti: „Prestati hraniti nakon teljenja.” U uputstvu o korištenju naznačiti: „Prestati hraniti nakon teljenja.” U uputstvu o korištenju naznačiti: „Ograničiti količinu hrane za životinje kako bi se garantovao najveći dnevni unos natrijum aluminijum silikata od 500g po životinji”. „Prestati hraniti nakon teljenja.” Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Uputstvo za korištenje, tj. broj davanja i vrijeme prije i nakon teljenja.” Tekst „Preporučuje se prije korištenja zatražiti savjet stručnjaka za ishranu životinja.”
Za smanjenje rizika od pojave ketoze	Izvori energije bogati prekursorima glukoze	Krave i ovce za mužu	Sastojci koji služe kao izvori energije bogati prekursorima glukoze Propan-1,2-diol (ako je dodat kao prekursor glukoze) Glicerol (ako je dodat kao prekursor glukoze)	Tri do šest nedelja nakon teljenja Posljednjih šest nedelja prije teljenja i prve tri nedelje poslije jagnjenja	
Za smanjenje rizika od pojave pašne tetanije (hipomagnezije)	Visok nivo magnezijuma, lako svarljivi ugljenohidrati, umjeren nivo proteina i nizak nivo kalijuma	Preživari	Skrob Ukupni šećer Magnezijum Natrijum Kalijum	Tri do deset nedelja tokom perioda brzog rasta trava	U uputstvima o korištenju dati smjernice o uravnoteženom dnevnom obroku sa posebnom pažnjom na uključivanje vlaknastih sirovina i sirovina sa lako dostupnim izvorima energije. U slučaju hrane za ovce na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Posebno za raspolodne ovce u laktaciji”.
Za smanjenje rizika od pojave acidoze	Nizak nivo fermentirajućih ugljenohidrata i visoki puferni kapacitet	Preživari	Skrob Ukupni šećer	Najviše dva mjeseca	U uputstvima o korištenju dati smjernice o uravnoteženom dnevnom obroku sa posebnom pažnjom na uključivanje vlaknastih sirovina i sirovina sa brzo fermentirajućim izvorima ugljenohidrata. -U slučaju hrane za mlječne krave, na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Posebno za visoko mlječeće krave.” U slučaju hrane za tov prezivara, na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Posebno za intenzivnu ishranu životinja.”
Za dugoročno snabdijevanje	Visok nivo -elemenata u tragovima, i/ili -.vitamina, provitamina i hemijski tačno definisanih materija sličnog efekta.	Preživari sa funkcionalnim buragom	nazive i ukupne količine svih dodatnih elemenata u tragovima, vitamina, provitamina i hemijski tačno definisanih materija sličnog efekta,	Do 12 mjeseci	primjena u obliku bolusa je dozvoljena. Bolus može da sadrži i do 20% gvožđa u inertnom obliku koji nije bio raspoloživ, da bi se povećala njegova gustina. Na oznaci hrane za životinje navodi se:

pašnih životinja elementima u tragovima i/ili vitaminima	Dopunska krmna smješa može da sadrži dodatke hrani za životinje u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.		dnevnu stopu otpuštanja za svaki element u tragovima i/ili vitamin ako se koristi bolus, najduži period kontinuiranog otpuštanja elementa u tragovima ili vitamina ako se koristi bolus.		„Izbjegavati istovremeno davanje dodataka sa najvišom količinom iz drugih izvora uz one koji su u sastavu bolusa, ako je primjenljivo. Prije upotrebe treba zatražiti savjet veterinara u pogledu: ravnoteže elemenata u tragovima u dnevnom obroku, stanja elemenata u tragovima u stadiu. bolus sadržava x% inertnog gvožđa kako bi se povećala njegova gustina, ako je primjenljivo.“
Za nadoknadu za nedostatak gvožđa nakon rođenja	Visok nivo jedinjenja gvožđa odobrenih u skladu sa funkcionalnom grupom „mineralna mješavina“ kategorije „nutritivni dodaci“. Dopunska krmna smješa može da sadrži gvožđe u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Prasad i telad	Ukupna količina gvožđa	Do tri mjeseca nakon rođenja	Upustvima za upotrebu hrane za životinje mora se garantovati poštovanje najviših količina gvožđa za potpunu krmnu smješu.
Za poboljšanje obnavljanja kopita, papaka i kože	Visok nivo cinka. Dopunska krmna smješa može da sadrži cink u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Konji, preživari i svinje	Ukupna količina--cinka, metionina.	Do osam nedjelja	Upustvima za upotrebu hrane za životinje mora se obezbjediti poštovanje najviših količina cinka za potpunu krmnu smješu.
Za poboljšanje pripreme životinje za estrus i razmnožavanje	-visok nivo selena, i -najmanja količina vitamina E po kilogramu potpune krmne smješe sa sadržajem vlage od 12% za svinje iznosi 53mg, za zečeve 35mg, pse, mačke, lasice 88mg, -najmanja količina vitamina E po životinji i danu za ovce iznosi 100mg, za goveda 300mg, za konje 1 100mg, ili -visok nivo vitamina A, -i/ili vitamina D, -i/ili najmanja količina beta-karotina od 300mg po životinji i danu. Dopunska krmna smješa može da sadrži selen, vitamine A i D u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Sisari	Nazivi i ukupne količine za sve dodate elemente u tragovima i vitamine.	Krave: dvije nedjelje prije završetka perioda gestacije sve do potvrde sljedeće gestacije, Krmače: sedam dana prije pa sve do tri dana nakon prašenja i sedam dana prije pa sve do tri dana prije parenja, Ostale ženke sisara: od posljednjeg dijela gestacije do potvrde sljedeće estacije, Mužjaci: tokom razdoblja aktivnosti razmnožavanja	Upustvima za upotrebu hrane za životinje mora se garantovati poštovanje najviših količina za potpunu krmnu smjesu. Na oznaci hrane za životinje navodi se: „Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korištenje ove hrane“.
	-visok nivo vitamina A i/ili vitamina D -ili -visok nivo selena i/ili cinka /ili najmanja količina vitamina E od 44mg/kg u potpunoj krmnoj smješi sa sadržajem vlage od 12%. Dopunska krmna smješa može da sadrži selen, cink, vitamine A i D u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Ptice	Nazivi i ukupne količine za sve dodate elemente u tragovima i vitamine.	za ženke: za vrijeme estrusa, za mužjake: tokom perioda aktivnosti razmnožavanja.	
Za očuvanje ravnoteže vode i elektrolita za podršku fiziološkog varenja	Pretežno elektroliti: natrijum, kalijum i hloridi Pufern kapacitet: najmanje 60 mmol po litru napitka pripremljenog za hranjenje Lakosvarljivi ugljenohidrati	Telad, svinje, jagnjad, jarad i ždrebad	Natrijum Kalijum Hloridi Izvor ugljenohidrata Bikarbonati i/ili citrati (ako su dodati)	Jedan do sedam dana	Preporučeni nivo elektrolita po litru napitka pripremljenog za hranjenje: Natrijum: 1,7g – 3,5g Kalijum: 0,4g – 2,0g Hloridi: 1g – 2,8g Na oznaci navodi se: „U slučajevima opasnosti, tokom poremećaja ili tokom oporavka od proliva.“ „Preporučuje se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti savjet veterinara.“ Navodi se u uputstvu o korištenju: Preporučen unos pripremljenog miješanog napitka i mlijeka, prema potrebi. U slučaju da je nivo bikarbonata i/ili citrata iznad 40mmol po litru napitka pripremljenog za hranjenje: „Istovremeno hranjenje mlijekom

					treba izbjegavati kod životinja sa sirištem."
Za smanjenje rizika od pojave mokračnih kamenaca	Nizak nivo fosfora i magnezijuma, svojstvo acidifikacije mokrače	Prežvari	Kalcijum Fosfor Natrijum Magnezijum Kalijum Hloridi Sumpor Materije koje acidifikuju mokraću	Do šest nedjelja	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Posebno za intenzivnu ishranu mlađih životinja.“ U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.“
Za smanjenje reakcije na stres	-Visok nivo magnezijuma i/ili -Lako svarljive sirovine	Svinje	Magnezijum Lako svarljive sirovine, a prema potrebi i način njihove prerade Sadržaj n-3 masnih kisjelina (ako su dodate)	Jedan do sedam dana	Dati uputstva u slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane
Za uspostavljanje fiziološkog varenja	Nizak pufernji kapacitet i lako svarljivi sastojci	Prasad	lako svarljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade, pufernji kapacitet, izvor adstringenata (ako su dodati), izvor sluzi (ako je dodata).	Dvije do četiri nedjelje	Na oznaci navodi se: „U slučajevima opasnosti od smetnji varenja, za vrijeme njihovog trajanja ili tokom oporavka od probavnih smetnji.“
	Lako svarljivi sastojci	Svinje	lako svarljivi sastojci i, prema potrebi, način njihove prerade, izvor adstringenata (ako su dodati), izvor sluzi (ako je dodata).		
	Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi „Stabilizatori crijevne flore“ kategorije „Zootehnički dodaci“ u skladu sa propisom o aditivima u hrani za životinje (Prilog 1) ili do zaključenja postupka ponovnog izdavanja odobrenja dodaci hrani za životinje koji pripadaju grupi ‘Mikroorganizmi’. Dopunska krmna smješa može da sadrži dodatke funkcionalne grupe „Stabilizatori crijevne flore/mikroorganizama“ u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Životinjske vrste za koje je odobreno korišćenje stabilizatora crijevne flore/mikroorganizama	Naziv i dodata količina stabilizatora crijevne flore/mikroorganizama	Do četiri nedjelje	-Na oznaci hrane za životinje navodi se: „U slučajevima opasnosti od probavnih poremećaja, tokom poremećaja ili tokom oporavka od probavnih poremećaja.“ Ako je primjenljivo: „Hrana za životinje sadržava stabilizator crijevne flore/mikroorganizme u koncentraciji više od sto puta većoj od odobrenе najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.“ U uputstvima za upotrebu hrane za životinje obezbjeđuje se poštovanje zakonske najviše količine stabilizatora crijevne flore/mikroorganizama za potpunu krmnu smješu.
Za smanjenje opasnosti od pojave zatvora	Materije koje podstiču pokretljivost crijeva	Krmače	Materije koje podstiču pokreljivost crijeva	Deset do 14 dana prije prašenja i deset do 14 dana nakon prašenja	
Za smanjenje opasnosti od pojave sindroma masne jetre	Nizak nivo energije uz visok udio metaboličke energije iz lipida i visok nivo polinezasićenih masnih kisjelina	Koke nosilje	Energetska vrijednost Postotak dijela metaboličke energije iz lipida Sadržaj poli-nezasićenih masnih kisjelina	Do 12 nedjelja	
Za uspostavljanje ravnoteže hranljivih materija pri malapsorpciji	Nizak nivo zasićenih masnih kisjelina i visok nivo vitamina rastvorljivih u mastima	Živila, osim gusaka i golubova	Dio zasićenih masnih kisjelina u ukupnim masnim kisjelinama Ukupni vitamin A Ukupni vitamin D Ukupni vitamin E Ukupni vitamin K	Tokom prve dvije nedjelje nakon izlijeganja pilića	
Za uspostavljanje ravnoteže hranljivih materija pri hroničnom smanjenju funkcije tankog crijeva	Ugljeni hidrati, proteini i masti visoke predcekalne svarljivosti	Kopitari	Izvor predcekalno visoko svarljivih ugljenih hidrata, proteina i masti, a prema potrebi i način njihove prerade	Do šest mjeseci	Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane za životinje i načinu na koji se hrana daje uz napomenu da se dnevno daje u većem broju manjih obroka. Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinaru.“
Za uspostavljanje ravnoteže hranljivih materija pri hroničnom smanjenju funkcije debelog crijeva	Lako svarljiva vlakna	Kopitari	Izvor vlakna Sadržaj n-3 masnih kisjelina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane za životinje i načinu na koji se hrana daje. Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinaru.“
Za smanjenje reakcije na stres	Lako svarljive sirovine	Kopitari	Magnezijum Lako svarljive sirovine, a prema potrebi i način njihove prerade Sadržaj n-3 masnih kisjelina (ako su dodate)	Dvije do četiri nedjelje	Dati uputstva u kojim se određenim slučajevima preporučuje korišćenje ove hrane za životinje.
Za nadoknadu	Pretežno elektroliti i lako resorptivni ugljeni hidrati	Kopitari	Kalcijum Natrijum Magnezijum	Jedan do tri dana	Dati uputstva o određenim slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane za životinje.

elektrolita u slučaju njihovog gubitka znojenjem			Kalijum Hloridi Glukoza		Kada ova hrana za životinje čini značajan dio dnevnog obroka, dati uputstva sa ciljem sprječavanja rizika zbog nagle promjene osobina hrane za životinje. U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.“
Za sportske napore i oporavak od njih	Visok nivo selena i najmanja količina od 50mg vitamina E po kilogramu potpune krmne smješe sa sadržajem vlage od 12%. Dopunska krmna smješa može da sadrži jedinjenja selena u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Kopitari:	Ukupna količina vitamina E, selena.	Do osam nedelja prije sportskog napora – do četiri nedelje nakon sportskog napora	Upustvom za upotrebu hrane za životinje moraju se poštovati najviše određene količine selenata za potpunu krmnu smješu.
Za uvođenje uobičajene ishrane ili oporavak	Visok nivo esencijalnih i lako svarljivih hranljivih materija	Kopitari	Lako svarljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade Sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodate)	Do postizanja oporavka	Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane. Ako se hrana daje sondom, na pakovanju, oznaci navodi se: „Davati pod nadzorom veterinara.“
Za podršku jetrenim funkcijama u slučaju hronične insuficijencije jetre	Nizak nivo proteina koji moraju biti visokog kvaliteta i visoko svarljivi ugljeni hidrati	Kopitari	Izvor proteina i vlakana Visoko svarljivi ugljeni hidrati, a prema potrebi i način njihove prerade Metionin Holin Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane za životinje i o načinu na koji se hrana daje uz napomenu da se dnevno daje u većem broju manjih obroka. Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.“
Za poboljšanje rada bubrega u slučaju hronične bubrežne insuficijencije	Nizak nivo fosfora i nizak nivo proteina visokog kvaliteta	Kopitari	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Magnezijum Natrijum	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.“ U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.“

Radi ostvarivanja nutritivne potrebe hrane za životinje, može da se koristi jedno ili oba osnovna nutritivna svojstva označena sa "i/ili, a za svako nutritivno svojstvo na oznaci se navodi odgovarajuća nutritivna potreba.

Dodaci hrani za životinje koji se dodaju hrani za životinje za posebne nutritivne potrebe, moraju da ispunjavaju zahtjeve utvrđene posebnim propisom i navode se na oznaci.

Na oznaci hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe navodi se porijeklo hrane ili porijeklo sastojaka u hrani, kao i informacije na osnovu kojih je moguće utvrditi usaglašenost hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe sa odgovarajućim osnovnim nutritivnim svojstvima (tačan naziv, naziv/vrstu sastojka i/ili sastojaka, vrstu životinja ili dijela tijela životinje).

Na oznaci hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe navodi se supstanca koja je prisutna u izvornom obliku koju sadrži ta hrana, a koja istovremeno predstavlja i dodatak hrani za životinje riječju „ukupno“ i to: količina izvorno prisutne supstance bez dodatka i/ili količina sa dodacima u skladu sa propisanim odstupanjima.

Kada hrana za životinje za posebne nutritivne potrebe sadrži sastojak ili dodatak hrani za životinje u povećanoj količini, radi obezbjeđivanja posebne nutritivne potrebe, na oznaci se navode informacija o količini povećanih sastojaka ili dodataka: „ako je dodato“.

Na oznaci hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe navodi se i preporučeni period korišćenja u kojem se očekuje postizanje nutritivnih potreba.

Za dopunske krmne smješe za posebne nutritivne potrebe, na oznaci se navodi uputstvo za upotrebu sa uputstvom za pripremu uravnuteženog dnevnog obroka.

Ukoliko se hrana za životinje za posebne nutritivne potrebe stavlja na tržište u obliku bolusa, koja je hranivo ili dopunska krmna smješa i koja je namijenjena za pojedinačno oralno davanje prisilnim hranjenjem životinja, na oznaci se navodi najduži period kontinuiranog otpuštanja bolusa i dnevne stopе otpuštanja za svaki dodatak i najviša količina dodatka po kilogramu potpune krmne smješe, tokom cijelog perioda hranjenja (učinak sporog otpuštanja) i dnevni nivo otpuštanja dodatka u probavnom traktu koji se ne smije premašiti.