

Broj:	04-
Podgorica:	19.08.2026.

UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE
VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

Predmet: Izvještaj o pregledu klopki i plodova za muvu malsline

Obavještavamo vas da je pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja (područje velikih maslinjaka – Valdanos) urađen 18.08.2026. Istovremeno, sa svakog lokaliteta, uzorkovani su plodovi radi pregleda u laboratoriji, koji je urađen istog dana.

U klopka je utvrđeno sljedeće stanje:

- Bar 1 McPhail 4 ♀♀ i 6 ♂♂, žuta ploča 1 ♀♀ i 2 ♂♂, GPS koordinate 42° 06' 16" N 19° 06' 02" E E,
- Bar 2 McPhail 0 ♀♀ i 0 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 1 ♂♂, GPS koordinate 42° 05 '27.1"N 19° 07' 27" E,
- Bar 3 McPhail 24 ♀♀ i 26 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 03' 00" N, 19° 08' 27" E,
- Valdanos 1 McPhail 3 ♀♀ i 3 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 31 "N 19°11' 02 E,
- Valdanos 2 McPhail 13 ♀♀ i 15 ♂♂, žuta ploča ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41°56' 28 "N 19° 11' 02" E,
- Valdanos 3 McPhail 12 ♀♀ i 12 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 28" N 19° 10' 57" E
- Valdanos 4 McPhail 3 ♀♀ i 3 ♂♂, žuta ploča ploča 0 ♀♀ i 1 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 23" N 19°11' 06" E

Muve su u McPhail klopka uglavnom hvatane na svim lokalitetima sa različitom brojnošću. Nisu hvatane samo na lokalitetu Bar 2. Na žutim pločama muve su hvatane na lokalitetima Bar 1, Bar 2 i Valdanos 4.

Pregled plodova, koji je urađen u laboratoriji, pokazao da je aktivna infestacija od 3,3 %, zabilježena na lokalitetima Bar 3, Valdanos 1 i Valdanos 3. Na ostalim lokacijama nije bilo aktivne infestacije. Na svim lokalitetima zabilježene su uginule larve u plodovima.

Imajući u vidu da je brojnost muva u klopka visoka, iako nema aktivne infestacije, maslinarima se preporučuje da urade hemijski tretman sa preparatom Success Bait. Radi se o spinosadu sa atraktantom koji privlači odrasle muve, a tretira se samo jedna grana sa južne strane svakog stabla. Takođe, može se primijeniti kaolinska glina (kaolin) kao mehanička zaštita, gdje se praktično okupa cijelo stablo. Na plodovima se stvara zaštitni sloj koji onemogućava movama da polažu jaja. Alternativa su piretroidi koji imaju dozvolu za primjenu u maslinjacima (npr. deltametrin).

S poštovanjem,

Izvještaj pripremila

Prof. dr Snježana Hrnčić

Dekan

Prof. dr Igor Pajovć