

ewfmd

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease

Bolest slinavke i šapa epidemiološka vremenska linija

European Commission for the
Control of Foot-and-Mouth Disease

Dan 1

Pojava prve
lezije.

Pitanja koja treba razmotriti



Koliki je maksimalni
period inkubacije
SiŠ-a kod goveda?

Maksimalni period
inkubacije SiŠ-a
goveda je 14 dana.

Kada je najraniji
mogući datum
infekcije?

Ako je lezija stara
4 dana + 1 dan
(prodromalni
period) + 14 dana
(maksimalni period
inkubacije) = prije
19 dana.

Kada je poslednji
mogući datum
infekcije?

Minimalni period
inkubacije je 1 dan.
Ako je lezija stara
4 dana, minimalno
vreme od infekcije
je 4 dana + 1 dan
(prodromalni
period) = 5 dana.

Kada je
najvjerojatnije
došlo do infekcije?

Period inkubacije
traje najčešće 2-6
dana pre pojave
kliničkih znakova.


Koji je vremenski period kada je moglo doći do prenosa bolesti?

Prenošenje bolesti može početi 2 dana prije pojave lezija kod goveda.

Kada je
najvjerojatnije došlo
do prenosa?


Potrebno je utvrditi
najvjerojatniji period
prenošenja bolesti.
Kod goveda je to
obično 1 do 2 dana
nakon pojave prvih
kliničkih znakova
bolesti.

Brza pomoć



BRZA POMOC

Vremenska linija



Lezije

Dan 0
Prodromalni
period

Period
izlučivanja

Prozor za
infekciju

Dan 1

Pojavljuje se
prva lezija

micro learning

Move FAST

Foot-and-mouth And Similar
Transboundary animal diseases

euFMD

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease



Funded by
the European Union