

ewfmd

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease

Bolest slinavke i šapa (Siš) Putevi širenja bolesti

European Commission for the
Control of Foot-and-Mouth Disease

Važno je shvatiti da širenje bolesti zavisi od načina prenosa.

Direktan kontakt sa životinjama ima veću vjerovatnoću da prenese bolest slinavke i šapa (SiŠ-a) u poređenju sa ostalim načinima prenošenja bolesti.

Važnost



Direktan kontakt između životinja



Važnost



Životinjski proizvodi





Važnost

+++

Mehanički fomiti

Važnost
++

Vjetar



Izdahnuti virus u
vazduhu može se
prenijeti vetrom.

Ovo je vjerovatnije
ako postoji izlučivanje
velikih količina virusa
(npr. sa velike farme
svinja), u određenim
meteorološkim uslovima
(niske temperature i
veća vlažnost vazduha
pogoduju prenosu virusa
vjetrom).

Iako je moguće da se virus SiŠa širi na relativno velike udaljenosti ovim načinom, to nije tako uobičajeno kao širenje direktnim kontaktom ili preko prenosioca (indirektno).

micro learning

Move FAST

Foot-and-mouth And Similar
Transboundary animal diseases

euFMD

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease



Funded by
the European Union